

欽定四庫全書

子部
傷寒論注釋卷一

詳校官太醫院八品吏目臣黃全

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣汪志伊



欽定四庫全書

子部五

傷寒論注釋

醫家類

提要

臣

等謹案傷寒論注釋十卷附傷寒明理論

三卷論方一卷傷寒論十卷漢張機撰晉王

叔和編金成無已注明理論三卷論方一卷

則無已所自撰以發明機說者也機字仲景

南陽人嘗舉孝廉建安中官長沙太守叔和

欽定四庫全書

傷寒論注釋

高平人官太醫令無已聊攝人生于宋嘉祐

治平間後聊攝地入于金遂為金人至海陵

王正隆丙子年九十餘尚存見開禧元年歷

陽張孝忠跋吳勉學刻此書題曰宋人誤也

傷寒論前有宋高保衡孫奇林億等校上序

稱開寶中節度使高繼沖曾編錄進上其文

理舛錯未能考正國家詔儒臣校正醫書今

先校定傷寒論十卷總二十二篇合三百九



十七法除重複定有一百一十三方

案一十三原本

誤作一十二今改正

今請頒行又稱自仲景于今八百

餘年惟王叔和能學之云云而明方有執作

傷寒論條辨則詆叔和所編與無已所注多

所改易竄亂併以序例一篇為叔和偽托而

刪之

國朝喻昌作尚論篇于叔和編次之舛序例之

繆及無已所注林億等所校之失攻擊尤詳

欽定四庫全書

傷寒論注釋

皆重為考定更其錯簡自謂復長沙之舊本

其書盛行于世而王氏成氏之書遂微然叔

和為一代名醫又去古未遠其學當有所受

無已于斯一帙研究終身亦必深有所得似

未可槩從屏斥盡以為非夫朱子改大學為

一經十傳分中庸為三十三章于學者不為

無裨必以為孔門之舊本如是則終無確證

可憑也今大學中庸列朱子之本于學官亦



列鄭元之本于學官原不偏廢又烏可以後											
人重定此書遂廢王氏成氏之本乎無已所											
作明理論凡五十篇論方一卷凡二十方於											
君臣佐使之義闡發尤明嚴器之序稱無已											
撰述傷寒義皆前人未經道者指在定體分											
形析證若同而異者明之似是而非者辨之											
釋戰慄有內外之診論煩燥有陰陽之別譚											
語鄭聲令虛實之灼知四逆與厥使淺深之											
欽定四庫全書											
傷寒論注釋											
類明云云其推挹甚重張孝忠跋亦稱無已											
此二集自北而南先以紹熙庚戌得傷寒論											
注十卷于醫士王光廷家後守荆門又于襄											
陽訪得明理論方四卷因為刊板于榔山則											
在當時固已深重其書矣乾隆四十六年九											
月恭校上											
總纂官											
紀昀											
陸錫熊											
孫士毅											
總校官											
陸費曄											



傷寒論注釋序

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意諸家莫其論擬故晉皇甫謐序甲乙鍼經云伊尹以元聖之才撰用神農本草以為湯液漢張仲景論廣湯液為十數卷用之多驗近世太醫令王叔和撰次仲景遺論其精皆可施用是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經得不謂祖述大聖人之意乎張仲景漢書無傳見名醫錄云南陽人名機仲景乃其字也舉孝廉官至長沙太守始受術於同郡張

欽定四庫全書

傷寒論注釋

伯祖時人言識用精微過其師所著論其言精而奧其法簡而詳非淺聞寡見者所能及自仲景于今八百餘年惟王叔和能學之其間如葛洪陶景胡洽徐之才孫思邈輩非不才也但各自名家而不能修明之開寶中節度使高繼沖曾編錄進上其文理舛錯未嘗考正歷代雖藏之書府亦闕於讐校是使治病之流舉天下無或知者國家詔儒臣校正醫書臣竒續被其選以為百病之急無急於傷寒今先校定張仲景傷寒論十卷總



二十二篇證外合三百九十七法除複重定有一百一十	二方金請頒行太子右贊善大夫臣高保衡尚書屯田	員外郎臣孫奇尚書司封郎中秘閣校理臣林億等謹	上注解傷寒論序	欽定四庫全書	傷寒論注釋
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------	--------	-------



傷寒論注釋序

夫前聖有作後必有繼而述之者則其教乃得著于世
矣醫之道源自炎黃以至神之妙始興經方繼而伊尹
以元聖之才撰成湯液俾黎庶之疾疫咸遂蠲除使萬
代之生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液為傷寒卒
病論十數卷然後醫方大備茲先聖後聖若合符節至
晉大醫令王叔和以仲景之書撰次成叙得為完帙昔
人以仲景方一部為衆方之祖蓋能繼述先聖之所作

欽定四庫全書

傷寒論注釋

迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷
寒論十卷其言精而奧其法簡而詳非寡聞淺見所能
賡究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自
幼徂老耽味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而近
升乎堂然未入於室常為之慊然昨者邂逅聊攝成公
議論該博術業精通而有家學注成傷寒十卷出以示
僕其三百九十七法之內分析異同彰明隱奧調陳脉
理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二



方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之攸
分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所適又
皆引內經旁牽衆說方法之辨莫不允當實前賢所未
言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂慊然者
今悉達其奧矣親覲其書誠難默默不揆荒蕪聊序其
略時甲子中秋日洛陽嚴器之序

欽定四庫全書

傷寒論注釋



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷一

金成無已注

辨脈法第一

問曰脈有陰陽者何謂也答曰凡脈大浮數動滑此名

陽也脈沈澹弱弦微此名陰也凡陰病見陽脈者生陽

病見陰脈者死

內經曰微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從五行生茲首論以脈從五行生故也陽道常競大浮數動滑五者比之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

平脈也有餘故謂之陽陰道常乏沈澹弱弦微五者比之平脈也不及故謂之陰傷寒之為病邪在表則見陽

脈邪在裏則見陰脈陰病見陽脈而主生者則邪氣自裏之表欲汗而解也如厥陰中風脈微浮為欲愈不浮

為未愈者是也陽病見陰脈而主死者則邪氣自表入裏正虛邪勝如瀕言妄語脈沈細者死是也金匱要畧

曰諸病在外者可治入裏者即死此之謂也問曰脈有陽結陰結者何以別

之答曰其脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結

也期十七日當劇其脈沈而遲不能食身體重大便反

鞭名曰陰結也期十四日當劇

結者氣偏結國陰陽之氣不得而解之陰中有陽陽中有陰陰陽相雜以為和不相雜以為結浮數陽

脈也能食而不大便裏實也為陽氣結固陰不得而解

欽定四庫全書

傷寒論注釋

之是名陽結沈遲陰脉也不能食身體重陰病也陰病見陰脉則當下利今大便難者為陰氣結因陽不得而解之是名陰結論其數者傷寒之病一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰至六日為傳經盡七日當愈七日不愈者謂之再經言再經者再自太陽而傳至十二日再至厥陰為傳經盡十三日當愈十三日不愈者謂之過經言再過太陽之經亦以次而傳之也陽結為火至十七日傳少陰水能制火火邪解散則愈陰結屬水至十四日傳陽明土能制水水邪解散則愈彼邪氣結甚水又不能制火土又不能制水故常劇內經曰一候後則病二候後則病其三候後則病危也問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何答曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脉微名曰陽不

足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足答曰

假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾陰偏不足則陽得而從之陽偏不足則陰得而乘之陽不足則陰氣上入

陽中為惡寒者陰勝則寒矣陰不足則陽脉浮陰脉弱

氣下陷入陰中為發熱者陽勝則熱矣陽脉浮陰脉弱

者則血虛血虛則筋急也陽為氣陰為血陽脉浮者衛

難經曰氣主均之血主濡之血其脉沈者榮氣微也經

云脉者血之府也脉實則血實脉虛則其脉浮而汗出

如流珠者衛氣衰也毛絨云衛氣者所以溫分肉充皮



如流珠者，膿理不密，開而不司，為衛氣外衰也。浮主候，衛沈主候，榮以浮沈別榮衛之衰微，理固然矣。然而衰其於微，所以於榮言微，而衛言衰者，以其汗出如流珠，為陽氣外脫，所以衛病甚於榮也。榮氣微者，加燒鍼，則血流不行，更發熱而躁煩也。衛陽也，榮陰也，陰榮氣微者，謂陰虛也。內經曰：陰虛生內熱，方其內熱，又加燒針，以稍陽不惟兩熱相合，而榮血不行，必更外發熱而內躁煩也。脈藹藹如車蓋者，名曰陽結也。者，大而脈藹藹也。為陽氣鬱結於外，不與陰氣和雜也。脈累累如循長竿者，名曰陰結也。陰氣鬱結於內，不與陽氣和雜也。脈瞤瞤如羹上肥者，陽氣微也。主微也。脈紫紫如蜘蛛絲者，陽氣衰也。紫紫滯也。若紫紫惹惹之不利也。如蜘蛛絲者，至細也。也。微為陽微，細為陽衰。脈要曰：微為氣瘵，是未至於內經曰：細則氣少。脈綿綿如瀉漆之絕者，亡其血也。以至於細為陽衰，宜矣。脈綿綿如瀉漆之絕者，亡其血也。綿綿者，連綿而散也。如瀉漆之絕者，前大而後細也。正理論曰：天樞開發，精移氣變，陰陽交會，胃和脈生，脈後生也。陽氣先至，陰氣後至，則脈前為陽氣，後為陰氣。脈來前大後細，為陽氣有餘而陰氣不足，是知亡血脈來緩時一止，復來者，名曰結脈。來數時一止，復來者，名曰促脈。陽盛則促，陰盛則結，此皆病脈。脈一息四至曰遲，小於遲曰遲，遲一息六至曰數，時有一止者，陰陽之氣不得相續也。陽行也，速陰行也，緩緩以候陰，若陰氣勝而陽不能相續，則脈來緩而時一止，數以候陽，若陽氣勝而陰不能相續，則脈來數而時一止，傷寒有結代。

欽定四庫全書

傷寒論注釋



之脉動而中止不能自還為死脉此結促之脉止是陰陽偏勝而時有一止即非脫絕而止云此皆病脉陰

陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者

此三焦傷也動為陰陽相搏方其陰陽相搏而虛者則

熱也如不出汗出發熱而反形冷惡寒者三焦傷也三焦

者原氣之別使主行氣於陽三焦既傷則陽氣不通而

微致身冷而惡寒也金匱要略曰陽若數脉見於關上

上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也脉經云陽

關為界關為陰陽之中也若數脉見於關上上下無頭尾

如豆大厥厥動搖者是陰陽之氣相搏也故名曰動

陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名

曰緩也陽脉寸口也陰脉尺中也上下同等無有偏勝

陽偏勝者為結為促陰陽相搏者為動脉浮而緊者名

曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無

常也脉經云弦與緊相類以弦為虛故雖緊而弦而按

是初之如轉索無常而不足也經曰弦則為減以緊為實

器曰脉緊如轉索無常者有宿食也脉弦而大弦則為

減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革

欽定四庫全書

傷寒論注釋



陽減而不能內固故主亡血失精婦人得之為陰血虛而不能滋養故主半產漏下問曰病有戰

而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反芤此為

本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故

當汗出而解也浮為陽緊為陰芤為虛陰陽爭則戰邪氣將出邪與正爭其人本虛是以發戰

正氣勝則戰戰已復發熱而大汗解也若脉浮而數按之不芤此人本不

虛若欲自解但汗出耳不發戰也浮數陽也本實陽勝邪不能與正爭故不

發戰也問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脉大而浮

數故知不戰汗出而解也陽勝則熱陰勝則寒陰陽爭則戰脉大而浮數皆陽也陽

欽定四庫全書傷寒論注釋

氣全勝陰無所爭何戰之有問曰病有不戰不汗出而解者何也答

曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無

津液此陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也脉微者邪

氣微也邪氣已微正氣又弱脉所以微既經發汗吐下

亡陽亡血內無津液則不能作汗得陰陽氣和而自愈

也也問曰傷寒三日脉浮數而微病人身涼和者何也答

曰此為欲解也解以夜半脉浮而解者澌然汗出也脉

數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也傷寒三日陽去

入陰之時病人身熱脉浮數而大邪氣傳也若身涼和脉浮數而微者則邪氣不傳而欲解也解以夜半者陽



生於子也。脉浮主瀉。然汗出而解者，邪從外散也。脉數主能食而解者，胃氣和也。脉微主大，汗出而解者，邪氣也。問曰：脉病欲知愈未愈者，何以別之？答曰：寸口關上

尺中三處大小浮沈遲數同等，雖有寒熱不解者，此脉

陰陽為和平，雖劇當愈。

三部脉均等即正氣已和，雖有餘邪何害之有。

立夏得

洪大脉是其本位。其人病身體苦疼重者，須發其汗。若

明日身不疼不重者，不須發汗。若汗濇濇自出者，明日

便解矣。何以言之？立夏得洪大脉，是其時脉，故使然也。

四時倣此。

脉來應時為正氣內固，雖外感邪氣但微自汗出而亦解。爾內經曰：脉得四時之順者，病

欽定四庫全書

傷寒論注釋

他問曰：凡病欲知何時得，何時愈？答曰：假令夜半得病，

明日日中愈；日中得病，夜半愈。何以言之？日中得病，夜半

愈者，以陽得陰則解也；夜半得病，明日日中愈者，以陰

得陽則解也。

日中得病者，陽受之；夜半得病者，陰受之。陽不和得陰則和，是解；以夜半陰不和得

陽則和是解。以日中經曰：用陽和陰，月陰和陽。

寸口脉浮為在表，沈為在裏，數

為在府，遲為在藏。假令脉遲，此為在藏也。

經曰：諸陽浮數為乘府，諸

陰遲濇為乘藏。

跌陽脉浮而濇，少陰脉如經也。其病在脾，法當

下利。何以知之？若脉浮大者，氣實血虛也。今跌陽脉浮



而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉弦而浮纔見

此為調脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也

跌陽者胃之脉診得浮而濇者脾胃不足也浮者以為

氣實濇者以為血虛者此非也經曰脉浮而大浮為氣

實大為血虛若脉浮大者為氣實血虛今跌陽脉浮而

濇浮則胃虛濇則脾寒脾胃虛寒則穀不消而水不別

法當下利少陰脉也腎為肺之子為肝之母浮為肺

脉弦為肝脉少陰脉弦而浮為子母相生故云調脉若

滑而數者則客熱在下焦使寸口脉浮而緊浮則為風

血流腐而為膿故屎膿也

緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當

發其汗也

脉經云風傷陽寒傷陰衛為陽榮為陰風為

發其汗也

陽寒為陰各從其類而傷也易曰水流濕火

就燥者是矣衛得風則熱榮得寒則痛榮衛

俱病故致骨節煩疼當與麻黃湯發汗則愈

欽定四庫全書

傷寒論注釋

而緩胃氣如經也跌陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾

此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脉反

但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脉動

脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脉反

浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀潮熱發

渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則饑數脉不

時則生惡瘡也

脉為常若脉浮數則為發妄下傷胃動



脾邪氣乘虛內陷也邪在表則見陽脈邪在裏則見陰脈邪在表之時脈浮而數也因下裏虛榮衛內陷邪客於脾以數則動脾今數先微則是脾邪先陷於裏也胃虛脾熱津液乾少大便必鞭絨絨曰脾病善噫得後出餘氣則快然而衆今脾客邪熱故氣噫而除脾能磨消水穀今邪氣獨留於脾脾氣不治心中雖飢而不能殺穀也脾主為胃行其津液脾為熱燥故潮熱而發渴也跌陽之脈本遲而緩因下之後變浮為數榮衛內陷數復改微是脈因前後度數如法邪熱內陷於脾而心中善飢也數脈不時者為數當改微而復不微如此則是邪氣不傳於裏但鬱於榮衛也師曰病人脈微而濇者此之中必出自肌皮為惡瘡也

為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈濇故知血亡也

微為亡陽濇則無汗之者令陽氣微陰氣上入陽中則惡寒故曰陽微則惡寒不當下而強與下之者令陰氣弱陽氣下陷入陰中則發熱故曰陰弱則發熱氣為陽血為陰陽脈以候氣陰脈以候血陰脈濇為榮血不足故知亡血經曰尺脈遲者不可發汗以

榮氣不足血少故也

脈浮而大心下反鞭有熱屬藏

欽定四庫全書

傷寒論注釋



者攻之不令發汗

浮大之脈常責邪在表若心下反發者則熱已甚而內結也有熱屬藏者

為別無虛寒而但見裏熱也藏屬陰為悉在裏故可下之攻之謂下之也

不可謂脈浮大更與發汗病源曰然毒氣乘心下痞滿

此為有實宜速下之屬府者不令洩數洩數則大便鞭

汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻

雖心下鞭若餘無裏證但見表證者為病在陽謂之屬府常在解表然後攻痞洩

小便也勿為飲結而利小便便其洩數大便必鞭也經曰小便數者大便必鞭謂走其津液也汗多則邪氣除

而熱愈汗少則邪熱不盡又走其津液必使難也難家當下設脈遲則未可攻以遲

為不足即裏氣未實故也脈浮而洪身汗如油喘而

不休水漿不下體形不仁乍靜乍亂此為命絕也

病有不可治者為邪氣勝於正氣也內經曰大則邪至又曰大則病進脈浮而洪者邪氣勝也身汗如油喘而不休者正

氣脫也四時以胃氣為本水漿不下者胃氣盡也一身以榮衛為充形體不仁者榮衛絕也不仁為痛痺俱不

知也針經曰榮衛不行故為不仁爭則亂安則靜乍靜乍亂者正與邪爭正負邪勝也正氣已脫胃氣又盡榮

衛俱絕邪氣獨勝故曰命絕也又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘

不休者為肺先絕也

肺為氣之主為津液之帥汗出髮潤者津脫也喘不休者氣脫也

陽反獨留形體如煙重直視搖頭者此心絕也

心主血氣為陽血為陰陽反獨留者則為身體大熱是血先絕而氣獨在也形體如煙重者為身無精華是血絕不榮於身也心脈俠咽系目直視者心經絕也唇吻反青四頭為諸陽之會搖頭者陰絕而陽無根也

欽定四庫全書

傷寒論注釋



肢漿習者此為肝絕也

唇吻者脾之候肝色青肝絕則真色見於所勝之部也四肢者

脾所主肝主筋肝絕則筋脈引急發於所勝之部也環口蠶

黑柔汗發黃者此為脾絕也

脾主口唇絕則精盡去故環口黑柔為陰柔汗冷

汗也脾胃為津液之本陽氣之宗柔澀便遺失狂言目

反直視者此為腎絕也

腎司開閉禁固便溺澀便遺失者腎絕不能約制也腎藏志狂

言者志不寧也內經曰狂言者是失志矣失志者死視者腎絕則骨之精不榮

於瞳子而瞳子不轉也又未知何藏陰陽前絕若陽

氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣

欽定四庫全書

傷寒論注釋

後竭者其人死身色必赤腋下溫心下熱也

陽主熱而色赤陰主

寒而色青其人死也身色青則陰未離乎體故曰陰氣

後竭身色赤腋下溫心下熱則陽未離乎體故曰陽氣

後竭鍼經曰人有兩死寸口脈浮大而醫反下之此為

大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不

知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即

飢經云脈浮大應發汗若反下之為大逆浮大之脈邪

在表也當發其汗若反下之是攻其正氣邪氣得以

深入故為大逆浮則無血者下後亡血也大則為寒者

邪氣獨在也寒邪因衰虛而入寒氣相搏乃為腸鳴醫

見脈大以為有熱故以冷水欲令水寒勝熱而作大汗



也。跌陽脉浮，浮則為虛。浮虛相搏，故令氣餒。言胃氣虛也。

渴也。脉滑則為噦。此為醫咎。責虛取實，守空迫血，脉浮

鼻中燥者，必衄也。跌陽脉浮為餒，脉滑為噦，皆醫之咎。責虛取實之過也。內經曰：陰在內陽

之守也。陽在外，陰之使也。發汗攻陽，亡津液而陽氣不足者，謂之守空經口。表氣微虛，裏氣不守，故使邪中於

陰也。陽不為陰守，邪氣因得而入。之內搏陰，血陰失所守，血乃妄行，未知從何道而出。若脉浮鼻燥者，知血必

從鼻中出也。諸脉浮數，當發熱而灑淅惡寒。若有痛處，飲食

如常者，畜積有膿也。浮數之脉，主邪在經，當發熱而洒淅惡寒。病人一身蟲痛，不欲飲食者，傷寒也。若雖發熱惡寒而痛偏著一處，飲食如常者，即非傷寒，是邪氣鬱結於經絡之間，血氣壅遏不通，欲

飲定四庫全書

傷寒論注釋

畜聚而成脉浮而遲，面熱赤而戰惕者，六七日當汗出

而解。反發熱者，差遲遲為無陽，不能作汗，其身必痒也。

脉浮而然，赤者邪氣外浮於表也。脉遲戰惕者，本氣不足也。六七日為邪傳經，盡當汗出而解之時。若當汗不汗，反發熱者，為氣虛津液不多，不能作汗。既不汗，邪無從

出，是以差遲發熱為邪氣浮於皮膚，必作身痒也。經曰：以其不能得小汗

出，故其身必痒也。寸口脉陰陽俱緊者，法當清邪中於

上焦，濁邪中於下焦。清邪中上，名曰潔也。濁邪中下，名

曰渾也。陰中於邪，必內慄也。表氣微虛，裏氣不守，故使

邪中於陰也。陽中於邪，必發熱。頭痛項強，頸攣腰痛，脛



酸所為陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣
為慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相
溷內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不
治胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流
若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經
絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣
厥微陰無所使客氣內入噦而出之聲嗝咽塞寒厥相
逐為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱

欽定四庫全書

傷寒論注釋

五液注下下焦不閤清便下重令便數難臍築湫痛命

將難全

浮為陽沈為陰陽脈緊則寒邪中於下焦上焦者太陽下焦者

少陰也發熱頭項強頭暈腰痛酸者霧露之氣中
於太陽之經也濁邪中下陰氣為深足脛逆冷便溺妄
出者寒邪中於少陰也因表氣微虛邪入而客之又裏
氣不守邪乘裏弱遂中於陰陰虛遇邪內為懼慄致氣
微急矣內經曰陽病者上行極而下陰病者下行極而
上此上焦之邪其則下于中焦下焦之邪其則上于中
焦由是三焦濁亂也三焦主持諸氣三焦既相濁亂則
內外之氣俱不得通膈中為熱與藏相煎口爛食斷內
外不得通於上焦而為熱與藏相煎口爛食斷內經曰
得平治中焦在胃之中焦為上下二焦之邪濁亂則不
也坤助胃氣磨消水穀脾氣不轉則胃中水穀不得磨



<p>清故胃中濁也全覆妥器曰穀氣不消胃中苦濁榮者水穀之精氣也衛者水穀之悍氣也氣不能布散致榮衛不通血凝不流衛氣者陽氣也榮血者陰氣也陽主為熱陰主為寒衛氣前通者陽氣先通而熱氣得行也內經曰脾主津液藏焉化則能出以小便赤黃知衛氣前通也熱氣與衛氣相搏而行出入藏府遊於經絡經絡客熱則血凝肉腐而為癰腫此見其熱氣得行若陰氣前通者則不然陽在外為陰之使因陽氣厥微陰無所使遂陰氣前通也內經曰陽氣者衛外而為固也陽氣厥微則不能衛外寒氣因而客之鼻者肺之候肺主聲寒氣內入者客於肺經則啞而出之聲啞咽塞寒者外邪也厥者內邪也外內之邪合并相逐為熱則血凝不流今為熱所擁使血凝自下如豚肝也上焦陽氣厥下焦陰氣厥二氣俱厥不相順接則脾氣獨弱不能行化氣血滋養五藏致五藏俱虛而五液注下錢經曰五藏不和使液溢而下流於陰關合也清關也下焦氣脫而</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>不合故數便而下重躋為生氣之原躋 集淋瀝則生氣欲絕故曰命將離全 脉陰陽俱緊者</p>	<p>口中氣出脣口乾燥蹠臥足冷鼻中涕出舌上胎滑勿</p>	<p>妄治也到七日已來其人微發熱手足溫者此為欲解</p>	<p>或到八日已上反大發熱者此為難治設使惡寒者必</p>	<p>欲嘔也腹內痛者必欲利也 脉陰陽俱緊為表裏客寒</p>	<p>出脣口乾燥者陽氣漸復正氣方滋也雖爾然而陰未</p>	<p>盡散蹠臥足冷鼻中涕出舌上滑胎知陰猶在也方陰</p>	<p>陽未分之時不可妄治以偏陰陽之氣到七日已來其</p>	<p>人微發熱手足溫者為陰氣已絕陽氣得復是為欲解</p>	<p>若過七日不解到八日已上反發大熱者為陰極變熱</p>	<p>邪氣勝正故云難治陽脉繫者寒邪發於上焦上焦主</p>
--	-------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



外也陰脈緊者寒邪發於下焦下焦主內也設使惡寒者上焦寒氣勝是必欲嘔也腹內痛者下焦寒氣勝是必欲利也脈陰陽俱緊至於吐利其脈獨不解緊去人安此

為欲解若脈遲至六七日不欲食此為晚發水停故也

為未解食自可者為欲解

脈陰陽俱緊為寒氣其於上

者為其脈獨不解緊去則人安為欲解若脈遲至六七日不欲食者為吐利後脾胃大虛內經曰飲入於胃遊

溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下

輸膀胱水精四布五經並行脾胃氣強則能輸散水飲

之氣若脾胃氣虛則水飲內停也所謂晚發者後來之疾也若至六七日而欲食者則脾胃已和寒邪已散故

云欲解病六七日手足三部脈皆至大煩而口噤不能言

其人躁擾者必欲解也

煩熱也傳經之時病人身大煩口噤不能言內作躁擾則陰陽

爭勝若手足三部脈皆至為正氣勝邪氣微陽氣復寒氣散必欲解也

若脈和其人煩

目重臉內際黃者此為欲解也

脈經曰病人兩目皆有黃色起者其病方愈病

以脈為主若目黃大煩脈不和者邪勝也其病為進目黃大煩而脈和者為正氣已和故云欲解脈浮

而數浮為風數為虛風為熱虛為寒風虛相搏則灑淅

惡寒也

內經曰有者為實無者為虛氣并則無血血并

於陰榮氣虛所以為寒風并於衛者發熱惡寒之證榮

浮而滑浮為陽滑為實陽實相搏其脈數疾衛氣失度



浮滑之脉數疾發熱汗出者此為不治

浮為邪氣并於衛而衛氣勝於榮

為邪氣并於榮而榮氣實邪氣勝實揅於榮衛則榮衛行達故脉數疾一息六至曰數平人脉一息四至衛氣行六寸今一息六至則衛氣行九寸計過平人之半足脉數疾知衛氣失其常度也浮滑數疾之脉發熱汗出而膏解若不解者精氣脫也必不可治

經曰脉陰陽俱盛大汗出不解者死

傷寒欬逆上氣

其脉散者死謂其形損故也

千金方云以喘欬為欬逆上氣者肺病散者心脉是心火刑於肺金也內經曰心之脉謂之死陰死陰之屬不過三日而死以形見其損傷故也

平脉法第二

問曰脉有三部陰陽相乘榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作效象形容

欽定四庫全書

傷寒論注釋

春弦秋浮冬沈夏洪察色觀脉大小不同一時之間變

無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒

改易進退低昂心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分

明師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關

寸為上部

關為中部

尺為下部

榮衛流行不失衡銓

衡銓者稱也

可以稱量

規

夏應寸短秋應中衡冬應寸權榮行脉中衡行

脉外榮衛與脉相隨上下應四時不失其常度

腎沈心

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心北方水王於冬而脉

腎北方水王於冬而脉

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

沈心南方火王於夏

洪肺浮肝弦此自經常不失銖分

而脉洪肺西方金王於秋而脉浮肝東方
木王於春而脉弦此為經常雖分之不差也 出入升降漏

刻周旋水下二刻一周循環

人身之脉計長一十六丈
二尺一呼脉行三寸一吸

脉行三寸一呼一吸為一息脉行六寸一日一夜漏水
下百刻人一萬三千五百息脉行八百一十六丈五寸

周於身則一刻之中人一百三十五息脉行八丈一尺
水下二刻人二百七十息脉行一十六丈二尺一周於

身也脉經之行終而後

始若循環之無端也 當復寸口虛實見焉

經脉之始
從中焦注

于手太陰寸口二百七十息脉行一周身復還至於寸
口寸口為脉之經始故以診視虛實焉經曰虛實死生

之要皆見於
寸口之中

變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅

沈潛水瀄支飲急弦動則為痛數則熱煩

風傷陽故脉
浮虛寒傷陰

欽定四庫全書

傷寒論注釋

故脉空堅而損於內者謂之水畜故脉沈潛支散於外
者謂之支飲故脉急弦動則陰陽相搏相搏則痛生焉

數為陽邪氣勝

陽勝則熱煩焉 設有不應知變所緣三部不同病各異

端 脉與病不相應者必緣傳變之所致三
部以候五藏之氣隨部察其虛實焉

太過可怪不

及亦然邪不空見中必有奸審察表裏三焦別焉知其

所舍消息診看料度府藏獨見若神為子條記傳與賢

人 太過不及之脉皆有邪氣干於正氣審看
在表在裏入府入藏隨其所舍而治之 師曰呼吸

者脉之頭也

難經曰一呼脉行三寸一吸脉行三寸以脉隨呼吸而行故言脉之頭也 初持

脉來疾去遲此出疾入遲名曰內虛外實也初持脉來



遲去疾此出遲入疾名曰內實外虛也

外為陽內為陰
內經曰來者為

陽去者為陰是出以候外入以候內疾為有餘有餘則
實遲為不足不足則虛來疾去遲者陽有餘而陰不足

故曰內虛外實來遲去疾者陽
不足而陰有餘故曰內實外虛問曰上工望而知之中

工問而知之下工脉而知之願聞其說師曰病家人請

云病人苦發熱身體疼病人自卧師到診其脉沈而遲

者知其差也何以知之表有病者脉當浮大今脉反沈

遲故知愈也

望以觀其形證問以知其所苦脉以別其
表裏病苦發熱身疼邪在表也當卧不安

而脉浮數今病人自卧而脉沈遲者表邪緩
也是表裏脉而無表證則知表邪當愈也假令病人

欽定四庫全書

傷寒論注釋

云腹內卒痛病人自坐師到脉之浮而大者知其差也

何以知之若裏有病者脉當沈而細今脉浮大故知愈

也腹病者裏寒也痛其則不能起而脉沈細今病人自
坐而脉浮大者裏寒散也是有表脉而無裏證也則

知裏邪當愈是望證問病切脉三者相參而得之可為
十全之醫鍼經曰知一為上知二為神知三神且明矣

師曰病家人來請云病人發熱煩極明日師到病人向

壁卧此熱已去也設令脉不和處言已愈

發熱煩極則
不能靜卧今

向壁靜卧
知熱已去設令向壁卧聞師到不驚起而盼視若三言

三止脉之嚙唾者此詐病也設令脉自和處言此病大



重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

詐病者非善人
以言恐之使其

畏懼則愈醫者

意也此其是也師持脉病人欠者無病也

鍼經曰陽引
而上陰引而

下陰陽相引故欠陰陽不相引則

病陰陽相引則和是欠者無病也脉之呻者病也

呻為
呻吟

之聲身有所

苦則然也言遲者風也

風客於中則經絡
急舌強難運用也

搖頭言者

裏痛也

裏有病欲言則
頭為之戰搖

行遲者表強也

表強者由筋絡
引急而行走不

利也坐而伏者短氣也

短氣者裏不和
也故坐而喜伏

坐而下一脚者腰

痛也

內經曰腰者身之大關節也腰痛為大關節
不利故坐不能正下一脚以緩腰中之痛也裏實

護腹如懷卵物者心痛也

心痛則不能伸仰
護腹以按其痛

師曰伏氣

欽定四庫全書

傷寒論注釋

之病以意候之今月之內欲有伏氣假令舊有伏氣當

須脉之若脉微弱者當喉中痛似傷非喉痺也病人云

實咽中痛雖爾今復欲下利

冬時感寒伏藏於經中不
即發者謂之伏氣至春分

之時伏寒欲發故云今月之內欲有伏氣假令伏氣已

發當須脉之審在何經得脉微弱者知邪在少陰少陰

之脉循喉嚨喉寒氣客之必發咽痛腎司閉閤少陰治在

下焦寒邪內其則閉閤不治下焦不約必成下利故云

雖余咽痛

復欲下利問曰人病恐怖者其脉何狀師曰脉形如循

絲纍纍然其面白脫色也

內經曰血氣者人之神恐
者血氣不足而神氣弱也脉

形似循絲纍纍然面白脫色者鍼經曰血奪者問曰人



不飲其脉何類師曰脉自濇唇口乾燥

濇為陰難主亡津液而唇口乾

燥以陰為主

內故不飲也問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色

乍白乍赤

愧者心也愧則神氣怯弱故脉浮而面色變改不常也

問曰經說脉有

三菽六菽重者何謂也師曰脉者人以指按之如三菽

之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者

脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也

菽豆也難經曰如三菽之重與皮毛相得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉

相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也各隨所主之分以候藏氣

欽定四庫全書

傷寒論注釋

假令下利寸口關上尺中悉不見脉然尺中時一小見

脉再舉頭者腎氣也若見損脉來至為難治

脉經曰冷氣在胃中

故今脉不通下利不見脉則冷氣客於脾胃今尺中時一小見為脾虛腎氣所乘脉再舉頭者脾為腎所乘也

若尺中之脉更或減損為腎氣亦衰脾復勝之鬼賊相刑故云難治是脾勝不應時也

問曰脉有

相乘有縱有橫有逆有順何也師曰水行乘火金行乘

木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘火火行乘

金名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

金勝木水勝火火勝金

言縱任其氣乘其所勝橫者言其氣橫逆反乘所不勝也縱橫與恣縱恣橫之義通水為金子火為木子行乘



母其氣逆也母行
乘子其氣順也 問曰脉有殘賊何謂也師曰脉有弦

緊浮滑沈澹此六者名曰殘賊能為諸脉作病也病者

名曰八邪風寒暑濕傷於外也飢飽勞逸傷於內也經

脉者榮衛也榮衛者陰陽也其為諸經脉作病者必白

風寒暑濕傷於榮衛客於陰陽之中風則脉浮寒則脉

緊中暑則脉滑中濕則脉澹傷於陰則脉沈傷於陽則

脉浮所以謂之殘賊者傷良曰 問曰脉有災怪何謂也

殘害良曰賊以能傷害正氣也 問曰脉有災怪何謂也

師曰假令人病脉得太陽與形證相應因為作湯比還

送湯如食頃病人乃大吐若下利腹中痛師曰我前來

不見此證今乃變異是名災怪又問曰何緣作此吐利

欽定四庫全書 傷寒論注釋

答曰或有舊時服藥今乃發作故名災怪耳 醫以脉證

而反變異為災怪 問曰東方肝脉其形何似師曰肝者

可怪故名災怪 問曰東方肝脉其形何似師曰肝者

木也名厥陰其脉微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得

濡弱者愈也 難經曰春脉弦者肝東方木也萬物始生

之平脉脉病得此脉 假令得純弦脉者死何以知之以

者為肝氣已和也 其脉如弦直是肝臟傷故知死也 純弦者為如弦直而

真藏之脉內經曰死肝脉 南方心脉其形何似師曰心

來急弦動如新張弓弦 者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪



大者愈也

心王於夏夏則陽外勝氣血

假令脉來微去

大故名反病在裏也脉來頭小本大者故名覆病在表

也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不

得尿頭無汗者可治有汗者死

心脉來盛去衰為平來微去大是反本脉內經

曰大則邪至小則平微為正氣大為邪氣來以候表來

微則知表邪去以候裏去大則知裏病內經曰心脉來

不盛去反盛此為不及病在中頭小本大者即前小後

大也小為正氣大為邪氣則邪氣先在表今復還於表

故名曰覆不云去而止云來者是知在表脉經曰在上

為表在下為裏汗者心之液上微為浮之而微頭小為

前小則表虛故主汗出下微為沈之而微本大為

後大沈則在裏大則病進內經曰心為牡藏小腸為之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

使今邪甚下行格閉小腸使正氣不通故不得尿名曰

關格脉經曰陽氣上出汗見於頭今葛格正氣不通加

之頭有汗者則陽氣不得下通而上脫也其西方肺脉

無汗者雖作關格然陽氣未衰而猶可治



浮者故知至秋死二月肝用事肝脉屬木應濡弱反得

毛浮者是肺脉也肺屬金金來剋木故知至秋死他皆

傲此當春時反見秋脉為金氣乘木肺來剋肝奪王師

曰脉肥人貴浮瘦人貴沈肥人當沈今反浮瘦人當浮

今反沈故責之肥人肌膚厚其脉當沈瘦人肌膚薄其

有邪氣相攻使脉反常故當責之師曰寸脉下不至關為陽絕尺脉上

不至關為陰絕此皆不治決死也若計其餘命死生之

期期以月節剋之也脉經曰陽生於寸動於尺陰生於

尺動於寸寸脉下不至關者為陽

絕不能下應於尺也尺脉上不至關者為陰絕不能

上應於寸也內經曰陰陽雜決精氣乃絕此陰陽偏

絕故皆決死期以月節剋之者謂師曰脉病人不病名

曰行尸以無王氣卒眩仆不識人者短命則死人病脉

不病名曰內虛以無穀神雖困無苦脉者人之根本也

本內絕形雖且強卒然氣脫則眩暈仆而死不曰行

尸而何人病脉不病則根本內固形雖且藏止內虛爾

穀神者穀氣也穀氣就足自然安矣內經曰形問曰翁

氣有餘脉氣不足死脉氣有餘形氣不足生

奄沈名曰滑何謂也沈為純陰翁為正陽陰陽和合故

令脉滑關尺自平陽明脉微沈食飲自可少陰脉微滑



滑者緊之浮名也此為陰實其人必股內汗出陰下濕

也脉來大而盛聚而沈謂之翕翕沈正如轉珠之狀也

沈為藏氣故曰純陰翕為府氣故曰正陽滑者陰陽

氣不為偏勝也謂尺自平陽明脉微沈者當陽部見陰

脉則陰偏勝而陽不足也陽明胃脉胃中陰多故食飲

自可少陰脉微滑者背陰部見陽脉則陽偏勝而陰不

足也以陽濇陰分故曰陰實股與陰少陰之部也今陽

熱濇陰必重發津液泄達於問曰曾為人所難緊脉從

何而來師曰假令亡汗若吐以肺裏寒故令脉緊也假

令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃中虛冷

故令脉緊也金匱要略曰寒令脉寸口衛氣盛名曰高

欽定四庫全書傷寒論注釋

高者暴狂而肥內經曰陰不勝其陽則脉流薄疾并乃

狂德為陽氣德盛而暴狂者陰不勝陽也鍼經曰衛氣

者所以溫分肉充皮毛肥膜理司開榮氣盛名曰章

閑者也衛氣盛為肥者氣盛於外也榮氣盛名曰章

章澤而光榮者血也榮華於高章相搏名曰綱

身者也榮盛故身暴光澤也綱者身

直榮衛俱盛衛氣弱名曰慄

則筋絡滿急衛氣弱名曰慄

動迫榮氣弱名曰卑

怯也榮氣弱名曰卑

慄卑相搏名曰損損者五藏六府之虛損也

於滋養致俱衛氣和名曰緩

病內經曰肝受血而能視足受血而能步掌受血而能

握指受血而能握四肢不收由榮血病不能灌養故也



榮氣和名曰遲

遲者身體重但欲眠也榮氣獨和不與衛氣相諧則衛病身體重而眠欲眠者

衛病而氣不敷布也

遲緩相搏名曰沈

沈者腰中直腹內急痛但欲臥不欲行榮氣獨和於

內衛氣獨和於外榮衛不相和諧相搏而為病腰中直者衛不利於外也腹內痛者榮不和於內也但欲臥不

欲行者榮衛不營也

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顏光

其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮

鞭陰陽相抱榮衛俱行剛柔相搏名曰強也

緩為胃脉胃合衛氣

衛濕分肉无皮毛肥腠理司開闔衛和氣舒則顏色光潤絳清毛澤矣遲為脾脉脾合榮氣榮養骨髓實肌肉

濡筋絡利關節榮和血滿則骨正髓生肌肉緊硬矣陰陽調和二氣相抱而不相戾榮衛流通則柔相得是為

欽定四庫全書

傷寒論注釋

壯跌陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強

痛還自傷以手把刃坐作瘡也

跌陽之脉以候脾胃滑則穀氣實是為胃實緊

則陰氣勝是為脾強以脾胃一實一強而相搏擊故令病也若一強一弱相搏則不能作病此脾胃兩各強實相

擊府藏自傷而病譬如以手把刃而成瘡豈非自貽其害乎

寸口脉浮而大浮為虛

大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆

經曰浮為虛內經曰大則病進浮則為正氣虛大則為邪氣實在尺則邪氣關閉下焦氣不得下通故不得

小便在寸則邪氣格拒上焦使食不得入故吐逆

跌陽脉伏而濇伏則吐逆水

穀不化濇則食不得入名曰關格

伏則胃氣伏而不宣中焦關格正氣壅塞



故吐逆而水澀不化，則脾氣滯而脈浮而大，浮為風，不布邪氣拒於上焦，故食不得入。

虛大為氣強，風氣相搏，必成癰瘡，身體為痒，痒者名泄。

風久久為痼癰，而脈息內經曰：脈風成癰，寸口脈弱。

而遲弱者，衛氣微遲者，榮中寒，榮為血，血寒則發熱，衛

為氣，氣微者，心內饑饉而虛滿不能食也。衛為陽，榮為陰，弱者衛氣

微，陽氣不足也。遲者，榮中寒，經中客邪也。榮客寒邪，搏而發熱也。陽氣內微，心內雖飢，飢而虛滿不能食也。

跌陽脈大而緊者，當即下利，為難治。大為虛，緊為寒，胃中虛寒，當即下利。

下利，脈當微，心反緊者，邪勝也。故云：難治。經曰：下利，脈大者，為未止。寸口脈弱而緩弱者，

欽定四庫全書
傷寒論注釋

陽氣不足，緩者，胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，氣填於

膈上也。弱者，陽氣不足，陽能消穀，陽氣不足，則不能消

化穀，食緩者，胃氣有餘，則胃中有未消穀物也。故使噫而吞酸，食卒不下，氣填於膈上也。跌陽脈緊而

金匱要畧曰：中焦不和，不能消穀，故令噫。跌陽脈緊而

浮，浮為氣緊，為寒，浮為腹滿，緊為絞痛，浮緊相搏，腸鳴

而轉轉，即氣動，膈氣乃下，少陰脈不出，其陰腫大而虛

也。浮為胃氣虛，緊為脾中寒，胃虛則滿，脾寒則痛，虛寒

相搏，腸鳴而轉轉，則膈中之氣因而下泄也。若少陰脈不出，則虛寒之氣至於下焦，結於少陰而聚於陰器，不得發泄，故陰腫大而虛也。寸口脈微而濇，微者，衛氣不行，濇者，榮氣不足，榮衛不能相將，三



焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣

虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞

中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

人養三焦者血也說三焦者養也榮衛俱損不能相將而行三焦

無所依仰身體為之頑痺而不仁內經曰榮衛虛則不

仁鍼經曰衛氣不行則為不仁榮為血血不足則煩疼

榮屬心榮弱心虛則口難言衛為陽陽微則惡寒衛為

氣氣虛則數欠三焦因榮衛不足無所依仰其氣不能

歸其部金匱要畧曰上焦竭善噫上焦受中焦氣中焦

未和不能消穀故令噫且下焦竭即遺溺失便以上焦

在膈上物未化之分也不歸者不至也上焦之氣不至

其部則物未能傳化故噫而酢吞中焦在胃之中主腐

熟水穀水穀化則思食中焦之食不歸其部則水穀不

化故云不能消穀引食下焦在膀胱上口主分別清

濁溲小便也下焦不歸其部不能約制溲便故遺溲

跌陽脉沈而數沈為實數消穀緊者病難治

沈為實者沈主裏也數消

穀者穀為熱也緊為肝脉見於脾部

木未起土為鬼賊相刑故云難治

寸口脉微而濇微

者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黃榮氣不足面

色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄效

逆唾腥吐涎沫也

衛為氣面色黃者衛氣衰也榮為血而色青者榮血衰也榮行脉中為根

微則陰陽之氣內衰致生寒慄而欲逆唾涎沫也



<p>肉甲錯浮乳相搏宗氣衰微四屬斷絕<small>經曰衛氣盛名而肥榮氣衰也肌肉甲錯而不澤者榮氣傷也宗氣者三焦歸氣也四屬者皮肉脂髓也榮衛衰傷則宗氣亦微四屬失所滋養致斷絕矣寸口脉微而</small></p>	<p>緩微者衛氣疎疎則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成榮盛</p>	<p>則其膚必疎三焦絕經名曰血崩<small>衛為陽微為亡陽脉者胃氣有餘有餘為實故云緩者胃氣實內經曰食入於胃淫精於脉是穀入於胃脉道乃行也鍼經曰飲而液滲於絡合和於血是水入於經其血乃成也胃中緩</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>消水化而為血氣今衛疎榮盛是榮氣強而衛氣弱也衛氣弱者外則不能固密皮膚而為之氣疎內則不能衛氣疎則氣不循常度三焦絕其常度也跌陽脉</p>	<p>微而緊緊則為寒微則為虛微緊相搏則為短氣<small>既虛且寒短氣自少陰脉弱而濇弱者微煩濇者厥逆</small></p>	<p>虛也陰虛則發熱以陰部見陽脉非大虛也故生微煩厥逆者四肢冷也經曰陰陽不相順接便為厥厥者手足厥冷是也少陰脉濇者陰氣濇</p>	<p>下身冷膚鞭<small>脾胃為榮衛之根脾能上下則水穀榮消榮衛之氣不得通營於外故跌陽脉不出少陰脉不至身冷者衛氣不溫也膚鞭者榮血不濡也</small></p>
---	---	--	-------------------------	--	--	--	--



腎氣微少精血奔氣促迫上入胃膈宗氣反聚血結心

下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥

當刺期門巨闕

尸厥者為其從厥而生形無所知其狀若尸故名尸厥少陰脈不出則厥氣客

於腎而腎氣微少精血厥氣上奔塞膈逆通正氣使宗氣反聚而血結心下鐵經曰五穀入于胃其糟粕

津液宗氣分為三隧宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心脉而行呼吸又曰榮氣者泌其津液注之於脉化而為

血以營四末今厥氣大甚宗氣反聚而不行則絕其呼吸血結心下而不流則四體不仁陽氣為厥氣所滯不

能宣發退下至陰股間與陰相動仁者柔也不仁者言不柔和也為寒熱痛痺俱不覺知者也陽氣外不為使

內不得通榮衛俱不能行身體不仁狀若尸也內經曰厥氣上行滿膝去形刺期門者以通心下結血刺巨闕

欽定四庫全書

傷寒論注釋

者以行胃中宗氣血氣流通厥氣退則避矣

寸口脉微尺脉緊其人虛損多

汗知陰常在絕不見陽也

寸微為亡陽尺緊為陰勝陽微陰勝故云虛損又加之多

汗則愈損陽氣是陰常在而絕不見陽也

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發

熱諸緊為寒諸乘寒者則為厥鬱胃不仁以胃無穀氣

脾瀯不通口急不能言戰而慄也

衛陽也微為衛氣微故云亡陽榮血也濡為

榮氣弱故云亡血弱為陰虛虛則發熱緊為陰勝故為寒諸乘寒者則陰陽俱虛而為寒邪乘之也寒乘氣虛

抑伏陽氣不得宣發遂成厥也鬱胃為胃不仁人也

不通於上下故使口急不能言戰者寒在表也慄者寒在裏也

問曰濡弱何以反適十



傷寒論注釋卷一										欽定四庫全書		和音 也鞋 戾利音 痼癩 力上音 代如下 噫 切為介 酢 酢音 冒 冒音 也冒 腎 乳 侯苦									
										傷寒論注釋											



欽定四庫全書

子部
傷寒論注釋卷二

詳校官太醫院八品史司臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣汪志伊



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷二

金成無已注

傷寒例第三

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽

此則四時正氣之序也

春夏為陽春溫夏熱者以陽之動始於溫盛於暑故也秋冬為

陰秋涼而冬寒者以陰之動始於涼盛於寒故也

冬時嚴寒萬類深藏君子固

密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳

冬三月純陰月事陽乃伏藏水

欽定四庫全書

傷寒論注釋

冰地所寒氣嚴凝當是之時善養生者出處因密去寒就溫則不傷於寒其涉寒冷觸冒霜雪為病者謂之傷

寒也其傷於四時之氣皆能為病

春風夏暑秋濕冬寒謂之四時之氣以傷

寒為毒者以其最成殺厲之氣也

熱為陽陽主生寒為陰陰主殺陰寒為病

最為肅殺

毒厲之氣中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於

肌膚至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於

溫也

內經曰先夏至日為溫病後夏至日為暑病溫暑之病本傷於寒而得之故大醫均謂之傷寒也

是以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非

時行之氣也凡時行者春時應暖而復大寒夏時應大



熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫

此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似

者此則時行之氣也四時氣候不正為病謂之時行之氣時氣所行為病非暴厲之氣感

受必同是以一歲之中夫欲候知四時正氣為病及時

行疫氣之法皆當按斗歷占之四時正氣者春風夏暑秋濕冬寒是也時行者

時行之氣是也溫者冬時感寒至春發者是也疫者暴厲之氣是也占前斗建審其時候之寒溫察其邪氣之

輕重而治之故下文曰九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月

雨水節後宜解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨

欽定四庫全書
傷寒論注釋

水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便

涼冬寒春溫夏熱秋涼為四時之正氣也從霜降以後至春分以前其有

觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也九月十月寒氣尚微為病則輕

十一月十二月寒冽已嚴為病則重正月二月寒漸將解為病亦輕此以冬時不調適有傷寒之人即為病也

此為四時正氣中而即病者也其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之

毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為

治不同證如後章此為時行之氣前云冬時應寒而反大溫者是也從立秋

節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為病者此



屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病

此為溫病也內經曰冬傷於寒

壽必病溫從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行

寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折

病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七

月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相

似但治有殊耳

此為疫病也是數者以明前斗感之法占其隨時氣候發病寒熱輕重不同耳

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名為二

十四氣也

節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

歲

然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有

至而太過者皆成病氣也

顯漏或有至而不去此一句按金匱要畧曰有未至而至

有至而不至有至而不去有至而太過何故也師曰冬

至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和

以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而

天未溫和此為至而不至以得甲子而天大寒不解此

為至而不去也以得甲子而天溫如夏五六月時此

為至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而

反者病至而不至者病未至而

至者病即是觀之說漏明矣

但天地動靜陰陽鼓擊

者各正一氣耳

內經曰陰陽者天地之道清陽為天動而不息濁陰為地靜而不移天地陰陽

之氣鼓擊而生春夏秋冬

是以彼春之暖為夏之暑彼



秋之愈為冬之怒

春暖為夏昇從生而至長也
秋愈為冬怒從肅而至殺也

是故冬

至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一陽氣下一

陰氣上也

十月六爻皆陰坤卦為月陰極陽未陽生於
子冬至之後一陽爻升一陰爻降於卦為復

言陽氣得復也四月六爻皆陽乾卦為用陽極陰未陰
生於午夏至之後一陽氣下一陰氣上於卦為姤言陰

得遇陽也內經曰冬至四十五日陽氣微上陰
氣微下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下斯則冬

夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也

陽生於子陰生
於午是陰陽相

接故曰合陽退於酉陰退於卯是陰陽相背故曰離內
經曰氣至之謂至氣分之謂分至則氣同分則氣異

陰陽交易人變病焉

天地陰陽之氣既交錯而不正人
所以變病內經曰陰陽相錯而變

欽定四庫全書

傷寒論注釋

由生此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也

內經

曰養生者必順於時春夏養陽以涼以寒秋
冬養陰以溫以熱所以然者從其根故也小人觸冒

必嬰暴疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取

不能順四時調養觸冒寒溫者必
成暴病醫者當在察審証而治之是以春傷於風夏

必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽冬傷

於寒春必病溫此必然之道可不審明之

當春之時風
氣大行春傷

於風風氣通於肝肝以春通玉風雖人之不能即發至
夏肝氣然後始動風淫未疾則當發於四肢夏以陽氣

外盛風不能外發故攻內而為飧泄痎瘧泄者下利未殺
不化而色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干於



肺肺以秋通王濕雖入之不能即發至冬肺衰然後濕
始動也而淫腹脹則當發為下利冬以陽氣內固濕氣
不能下行故上逆而為咳嗽當夏之時腎氣大行夏傷
於暑夏以陰為主內暑雖入之勢未能動及秋陰出而
陽為內主然後暑動傳陰而為痼癰癰者二日一發癰
者一日一發當冬之時寒氣大行冬傷於寒冬以陽為
主內寒雖入之勢未能動及春陽出而陰為內主然後
寒動傳陽而為溫病是感冒四時正氣為病必然之道
傷寒之病逐日淺深以施方治

內經曰未滿三日者可泄而已其滿三日者可泄

而已今世人傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹

困乃告醫醫人又不依次第而治之則不中病皆宜臨

時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診

欽定四庫全書

傷寒論注釋

脉聲色對病真方有神驗者擬防世急也

仲景之言達今千年而顯用

於世者三叔和之力也

又土地溫涼高下不同物性剛柔食居亦

異是黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開

其未悟者臨病之工宜須兩審也

東方地氣溫南方地

方地氣寒西北方高東南方下是土地溫涼高下不同

也東方安食居食魚西方陵居食食南方濕處而嗜酸北

方野處而食乳是瘠居之異也東方治宜砭石西方治

宜毒藥南方治宜微針北方治宜灸炳是四方醫治不

同也醫之治病當審其土地所宜凡傷於寒則為病熱熱雖甚不死

內經曰風寒客於人使人毫毛直皮膚閉而為熱是傷寒

為病熱也鍼經曰多熱者易已多寒者難已足熱難其



不若兩感於寒而病者必死表裏俱病者尺寸俱浮者

太陽受病也當一二日發以其脉上連風府故頭項痛

腰脊強

太陽為三陽之長其氣浮於外故尺寸俱浮是邪氣初入皮膚外在表也當一二日發風府穴

名也項中央太陽之脉從顛入絡腦還出別下項是以連風府其經循肩膊內俠脊抵腰中故病頭項痛腰

脊強尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脉俠鼻

終於目故身熱目疼鼻乾不得卧

陽明血氣俱多尺寸俱長者邪併陽明而

血氣津液也太陽受邪不已傳於陽明是當二三日發其脉俠鼻者陽明脉起於鼻交頰中絡於目陽明之脉

正上頰頰還出繫目系身熱者陽明主身之肌肉鍼經曰陽明氣盛則身以訢皆熱目疼鼻乾者經中客邪也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

不得卧者胃氣逆不得從其道也內經曰胃不和則卧不安

尺寸俱弦者少陽受病

也當三四日發以其脉循脇絡於耳故脅脇痛而耳聾

內經曰陽中之少陽通於春氣春脉弦尺寸俱弦者知少陽受邪也二三日陽明之邪不已傳於少陽是當三

四日發脅脇痛而耳聾者經壅而不利也此三經皆受病未入於府者可汗

而已三陽受邪為病在表法當汗解然三陽亦有便入府者入府則宜下故云未入於府者可汗而已

尺寸俱沈細者太陰受病也當四五日發以其脉布胃

中絡於嗌故腹滿而嗌乾

陽極則陰受之邪傳三陽既通次乃傳於陰經在陽為在

表在陰為在裏邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陽邪傳陰邪氣內陷故太陰受病而脉尺寸俱沈細也自



三陽傳於太陰是常四五日發也邪入於陰則漸成熟腹滿而噤乾者脾經乘而成熱也尺寸俱沈

者少陰受病也當五六日發以其脉貫腎絡於肺繫舌

本故口燥舌乾而渴

少陰腎水也性趣下少陰受病脉尺寸俱沈也四五日太陰之邪不

已至五六日則傳於少陰也是少陰病背五六日發人傷於寒則為病熱謂始為寒而終成熟也少陰為病口

燥舌乾而渴邪傳尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七

日發以其脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮也緩者風脉也厥陰脉

微緩者邪傳厥陰熱氣已劇近於風也當六七日發以少陰邪傳於厥陰煩滿而囊縮者熱氣聚於內也此

三經皆受病已入於腑可下而已

三陰受邪為病在裏於法當下然三陰亦

欽定四庫全書

傷寒論注釋

有在經者在經則宜汗故云已入於腑者若兩感於寒者

一日太陽受之即與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴

二日陽明受之即與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫

語三日少陽受之即與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水

漿不入不知人者六日死若三陰三陽五藏六府皆受

病則榮衛不行府藏不通則死矣

陰陽俱病表裏俱傷者為兩感以其陰陽

兩感病則兩證俱見至於傳經則亦陰陽兩經俱傳也

始得一日頭痛者太陽口乾煩滿而渴者少陰至二日則太陽傳於陽明而少陰亦傳於太陰身熱譫語者陽明腹滿不欲食者太陰至三日陽明傳於少陰而太陰



又傳於厥陰耳聾者少陽受縮而厥者厥陰水漿不入
不知人者胃氣不通也內經曰五藏已傷六府不通榮
衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二
經脈之長也其血氣盛故云不知人三日其氣乃盡故
死矣謂三日六經俱病榮衛之氣不得行於內外府藏
之氣不得通於上下至六日府藏之氣俱盡榮衛之氣
俱絕則死矣其不兩感於寒更不傳經不加異氣者至七日

太陽病衰頭痛少愈也八日陽明病衰身熱少歇也九
日少陽病衰耳聾微聞也十日太陰病衰腹減如故則
思飲食十一日少陰病衰渴止舌乾已而噦也十二日
厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病人精神爽慧也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

六日傳過三陰三陽之氣皆和大邪之氣皆去病人精神爽慧也

若過十三日以上不

間尺寸陷者大危

問者瘳也十二日傳經盡則背瘳愈

治者如正氣內衰邪氣獨勝故云大危

若更感異氣變為他病者當依舊

壞證病而治之若脉陰陽俱盛重感於寒者變為溫瘧

異氣者為先病未已又感別異之氣也兩邪相合變為

他病脉陰陽俱盛者傷寒之脉也雖經曰傷寒之脉陰

陽俱盛而緊滑經曰脉盛身寒得之傷寒則為陽脉浮

滑陰脉濡弱者更遇於風變為風溫此於前熱未歇又感
中風之脉陽浮而滑陰濡而弱風來乘熱故變風溫陽脉洪數陰脉實大者遇溫



熱變為溫毒溫毒為病最重也

此前熱未已又感溫熱者也陽主表陰主裏洪

數實大皆然也兩熱相合變為溫毒以其表裏俱熱故為病最重

陽脉濡弱陰脉弦緊

者更遇溫氣變為溫疫以此冬傷於寒發為溫病脉之

變證方治如說

此前熱未已又感溫氣者也溫熱相合變為溫疫

凡人有疾不

時即治隱忍冀差以成痼疾

凡覺不佳急須求治苟延時日則邪氣入深難可復

制千金曰凡有少苦似不如平常即須早道若隱忍不治冀望自差須臾之間以成痼疾此之謂也小兒

女子益以滋甚

小兒氣血未全女子血室多病凡所受邪易於滋蔓

時氣不和便

當早言尋其邪由及在腠理以時治之罕有不愈者

理腠

欽定四庫全書

傷寒論注釋

者津液腠泄之所文理經會之中也金匱要畧曰腠者是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚藏府

之文理也邪客於皮膚則邪氣浮淺易為散發若以時治之罕有不愈者矣金匱玉函曰生候長存形色未病

未入腠理針藥及時股將調藥委以良醫病無不愈患人忍之數日乃說邪氣入

藏則難可制此為家有患備慮之要

邪在皮膚則外屬陽而易治邪傳入

裏則內屬陰而難治內經曰善治者治皮毛其次治肌

膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏治五藏者半死半生也昔桓侯怠於皮膚之微疾凡作湯藥不可避

晨夜覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣

千金曰凡始覺

不佳即須治發達至於病湯食競進折其毒勢自然而差若或差遲病即傳變雖欲



除治必難為力

傳有常也變無常也傳為循經而傳如太陽傳陽明是也變為不常之變如陽

證變陰證是也邪既傳變病勢深也本草曰病勢已成可得半愈病勢已過命將難全服藥正如

方法縱意違師不須治之

內經曰拘於鬼神者不可與言至德惡於針石者不可與

言至巧病不許治者病必不治治之無功矣凡傷寒之病多從風寒得之中凡

風與傷寒為病自古通謂之傷寒千金曰夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛隔周身不道

病始表中風寒入裏則不消矣始自皮膚入於經絡傳於臟腑是也未有

溫覆而當不消散者風寒初客於皮膚便投湯熨溫暖發散而當者則無不消散之邪

不在證治擬欲攻之猶當先解表乃可下之

已解表而後下之則

欽定四庫全書 傷寒論注釋

無復傳之邪也若表已解而內不消非大滿猶生寒熱則病不

除表證雖罷裏不至大堅滿者亦未可下之是邪未收歛成實下之則裏虛而邪復不除猶生寒熱也若

表已解而內不消大實堅有燥屎自可除下之雖

四五日不能為禍也

外無表證裏有堅滿為下證悉具外臺云表和裏病下之則愈下證

說具則不必拘於日數若不宜下而便攻之內虛熱入協熱遂利

煩躁諸變不可勝數輕者困篤重者必死矣

下之不當病輕者證

猶變易而難治又經重者乎夫陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛

陰盛汗之則愈下之則死

表為陽裏為陰陰虛者陽必湊之陽盛之邪乘其裏虛而



入於府者為陽，盛陰虛也。經曰：尺脈弱，名曰陰不足。陽反汗之，則竭其津液而死。陰脈不足，陽往從之，陽脈不足，陰往乘之，陰邪乘其表虛，客於榮衛之中者，為陽虛。陰盛也。經曰：假令寸口脈微，名曰陽不足，陰氣上人，陽中則洒淅惡寒者是矣。汗之散其表寒，則愈。若反下之，則脫其正氣而死。經曰：本發汗而復下之，此為逆也。本先下之而反汗之，為逆。

夫如是則神

丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治相背千里

吉凶之機應若影響豈容易哉

神丹者發汗之藥也甘遂者下藥也若汗下當

則言汗下不當則凶其應如影隨形如響應聲

況桂枝下咽陽盛則斃承氣入

胃陰盛以亡

桂枝湯者發汗藥也承氣湯者下藥也金匱玉函曰不當汗而強與汗之者令人奪

欽定四庫全書

傷寒論注釋

其津液枯竭而死不當下而強與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死

死生之要在乎須

臆視身之盡不暇計日

投湯不當則災禍立見豈暇計其日數哉

此陰陽虛

實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫

術淺狹憐然不知病源為治乃悞使病者殞歿自謂其

分至令冤魂塞於冥路死屍盈於曠野仁者鑒此豈不

痛歟凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而

執迷妄意者乃云神丹甘遂合而飲之且解其表又除

其裏言巧似是其理實違夫智者之舉錯也常審以慎



愚者之動作也必果而速安危之變豈可詭哉世上之士

但務彼翕習之榮而莫見此傾危之敗惟明者居然能

護其本近取諸身夫何遠之有焉

雨感病俱作欲成不治之疾醫者大宜消

息審其先後次第而治之若妄意

攻治以求速效者必致傾危之敗凡發汗溫服湯藥其

方雖言日三服若病劇不解當促其間可半日中盡三

服若與病相阻即便有所覺重病者一日一夜當晡時

觀之如服一劑病證猶在故當復作本湯服之至有不

肯汗出服三劑乃解若汗不出者死病也

發汗藥類溫緩服者易

欽定四庫全書

傷寒論注釋

為發散也日三服者藥勢緩也病勢稍重當促急服之

以折盛熱不可拘於本方設藥病不相對湯入即便知之

如陰多者投以涼藥即寒逆隨生陽多者飲以溫劑則

熱毒即起是便有所榮晡時者周時也一日一夜服湯

藥盡劑更看其傳如病證猶在當復作本湯以發其汗

若服三劑不解汗不出邪氣大甚湯不能勝必成大疾

千金曰熱病脈躁盛而不

得汗者此陽脈之極也死凡得時氣病至五六日而渴



汗出是為自愈也

熱在上焦則為消渴言熱消津液而

熱少不能消之若強飲則停飲變為諸病至七八日陽

勝氣溫向解之時多向生大渴亦須少少與之以潤胃

氣不可極愈飲也若飲而腹滿小便不利若喘若噦者

為水飲內停而不散不可更與之忽然陽氣通水氣散

先發於外作 凡得病反能飲水此為欲愈之病其不曉

病者但聞病飲水自愈小渴者乃強與飲之因成其禍

不可復數

小渴者為腹中熱少若強與水飲不消復為諸飲病也

凡得病厥脈動

數服湯藥更遲脈浮大減小初躁後靜此皆愈證也

數動之脈邪在陽也湯入而變遲者陽邪愈也浮大之脈邪

在表也而復減小者表邪散也病初躁亂者邪所煩也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

湯入而安靜者藥勝

病也是皆為愈證 凡治溫病可刺五十九穴

五十九穴者以

寫諸經之溫熱鍼經曰熱病取之諸陽五十九穴刺以

寫其熱而出其汗實其陰而補其不足所謂五十九穴刺

兩手內外側各三凡十二痛五指間各一凡八痛足亦

如是頭入髮際一寸旁三分各三凡六痛更入髮三寸

邊五凡十痛耳前後口下各一項中一穴凡六痛顛上

一穴會一髮際一廉泉一風池二天柱二又內經曰熱

俞五十九穴頭上五行行五者以寫諸陽之熱逆也太杼膺

俞缺盆背俞此八者以寫胃中之熱也雲門髃骨委中髓空

上下廉此八者以寫胃中之熱也雲門髃骨委中髓空

此八者以寫四支之熱也五藏俞旁五此十者以寫五

藏之熱也凡此五十九 人身之穴三百六十有五其三

穴者皆熱之左右也

十九穴灸之有害七十九穴刺之為災并中髓也

三百



六十五以應一歲其炎刻之禁皆內薄骨
解之處血脉虛少之分鍼灸并中髓也 凡脉四損三

日死平人四息病人脉一至名曰四損脉五損一日死

平人五息病人脉一至名曰五損脉六損一時死平人

六息病人脉一至名曰六損四藏氣絕者脉四損五藏氣絕者脉五損六府

俱絕者脉六損脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑內經曰脉

者血之府也脉實血實脉虛血虛寒則傷血邪併於血則血凝而氣虛故傷寒者脉凝而身寒熱則傷氣邪併

於氣則氣盛而血虛故傷暑者脉虛而身熱 脉陰陽俱盛大汗出不解者死

脉陰陽俱盛當汗出而解若汗出不解則邪氣內勝正氣外脫故死內經曰汗出而脉尚躁盛者死千金曰熱病

欽定四庫全書

傷寒論注釋

已得汗脉尚躁盛此陽脉之極也死 脉陰陽俱虛熱不止者死脉陰陽俱虛者真氣

弱也然不止者邪氣勝也 脉至乍疎乍數者死為天真榮衛之

氣斷也 脉至如轉索者其日死為緊急而不緩是亡無胃氣故不出其日而死 譌

言妄語身微熱脉浮大手足溫者生逆冷脉沈細者不

過一日死矣經言妄語陽病也身微熱脉浮大手足溫為脉病相應若身逆冷脉沈細為陽病見

陰脉脉病不相應故不過一日而死難 此以前是傷寒

熱病證候也

辨瘧濕暍脉證第四



傷寒所致太陽瘧濕渴三種宜應別論以為與傷寒相

似故此見之瘧當作瘧傳寫之誤也瘧者惡也非強也

而無力瘧謂骨瘧而不隨瘧者強也千金以強直為瘧

經曰頸項強急口噤背反張者瘧即瘧是觀之瘧為瘧字

明矣太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧千金曰太陽

濕則變瘧太陽病發熱無汗為表實則不當惡寒今反

惡寒者則太陽中風重感於寒為瘧病也以表實感寒

故名剛瘧太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔瘧太陽病發

表虛則當惡寒其不惡寒者為陽明病今發熱汗出而

不惡寒者非陽明證則是太陽中風重感於濕為柔瘧

也表虛感濕故曰柔瘧太陽病發熱脉沈而細者名曰瘧

欽定四庫全書傷寒論注釋

病發熱為表病脉當浮大今脉反沈細既不愈則太陽

中風重感於濕而為瘧也金匱要畧曰太陽病其證備

身體強凡凡然脉反沈遲此為瘧瘧桂枝湯主之

太陽病發汗太多因致瘧太陽病發汗太多則亡陽內經曰陽氣者精則養神柔

則養筋陽微不能養筋則筋脉緊急而成瘧也病身

熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭面搖

卒口噤背反張者瘧病也太陽中風為純中風也太陽

病是太陽中風重感寒濕乃變為瘧也身熱足寒者寒

濕傷下也時頭熱而赤目脉赤風傷於上也頭搖者風

主動也獨頭搖者頭為諸陽之會風傷陽也若純傷風

者身亦為之動搖手足為之搐搦此者內挾寒濕故頭

搖也口噤者寒主急也卒口噤者不常噤也有時而緩

若風寒相搏則口噤而不時開此者加之風濕故卒口



喉也足太陽之脉起於目內眥上額交頤上其支別者從頤入絡腦還出別下項循肩膊內夾脊抵胛中下貫脊以下至足風寒客於經中則筋脉拘急故頸項強急而背反張也太陽病關節疼痛而

煩脉沈而細者此名濕痺濕痺之候其人小便不利大

便反快但當利其小便

金匱要略曰濕傷皮腠濕流關節疼痛而煩者濕氣內流也濕

同水也脉沈而細者水性趨下也痺痛也因其關節煩

疼而名曰濕痺非脚氣之瘡也內經曰濕勝則濡泄小

便不利大便反快者濕氣內勝也但當利其小便以濕

宣泄腹中濕氣古云治濕之病不利小便非其治也濕

家之為病一身盡疼發熱身色如似重黃身黃如橘者陽明瘡

熱也此身色如似重黃即非陽明瘡熱身黃發熱者梔

子葉皮湯主之為表裏有熱則身不疼痛此一身盡疼

欽定四庫全書 傷寒論注釋

非傷寒客熱也知濕邪在經而使之脾惡濕濕傷則脾

病而色見是以身發黃者為其黃如煙黃非正黃色也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則

噦胃滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胃中有寒

渴欲得水而不能飲則口燥煩也濕家有風濕有寒濕此寒濕相搏雖有汗而不能周身

勝則多汗傷寒則無汗寒濕相搏雖有汗而不能周身故但頭汗出也背陽也陰也太陽之脉夾脊抵胛太



也 燥煩 濕家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不

止者亦死 濕家發汗則愈金匱要畧曰濕家身煩疼可

逆額上汗出而微喘者乃陽氣上逆也小便自利或下

利者陰氣下流也陰陽相輔故云死矣內經曰陰陽離

決精氣 問曰風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值

天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也答曰

發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治

風濕者發其汗但微微似欲汗出者風濕俱去也 陰雨

不止明其濕勝也內經曰陽受風氣陰受濕氣又曰傷

於風者上先受之傷於濕者下先受之風濕相搏則風

欽定四庫全書 傷寒論注釋 在外而濕在內汗大出者其氣暴暴則外邪出而裏邪

不能出故風去而濕在汗微微而出者其氣緩緩則內

外之邪皆出故 濕家病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛

鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無病病在頭中寒

濕故鼻塞內藥鼻中則愈 病有淺深證有中外此則濕

云關節煩疼而云身上疼痛是濕氣不流關節而外客

肌表也不云發熱身似煎黃復云發熱而黃而喘是濕

不汗於脾而薄於上焦也陰受濕氣則濕邪為深今頭

痛鼻塞而煩是濕客於陽而不客於陰也濕家之脉當



此名風濕此病傷於肝出當風或久傷取冷所致也

身一
產疹者濕也發熱日晡所病者風也若汗出當風而得

之者則先客濕而後感風若久傷取冷得之者則先傷

風而後中濕可與麻黃杏仁湯
茲仁甘草湯見金匱要略中方

太陽中熱者喝是也其
人汗出惡寒身熱而渴也

汗出惡寒身熱而不渴者中
風也汗出惡寒身熱而渴者

中喝也白虎加人參湯
主之見金匱要略中方

太陽中喝者身熱疼重而脉微
弱此亦夏月傷冷水水行皮中所致也

經曰脉虛身熱
得之傷暑身熱

脉微弱者喝也身體疼重者水也夏時暑熱以水
灌洗而得之一物爪節散主之見金匱要略中方

太陽
中喝者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已

洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥

若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

有病
左表有左裏者有表裏俱病者此則表裏俱病者也發

熱惡寒身重疼痛者表中也脉弦細芤遲者中暑脉

虛也小便已洒洒然毛聳手足逆冷者太陽經氣不足

也小有勞身即熱者謂勞動其陽而喝即發也口開前
板齒燥者裏有熱也內經曰因於暑汗煩則喘喝口開

謂喘喝也以喘喝不止故前板齒乾燥若發汗以去表
邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫針助陽則火熱內攻

辨太陽病脉證并治法上第五

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮者
太陽受病太陽受



病太陽主表為諸陽主氣脉浮頭
項強痛而惡寒者太陽表病也 太陽病發熱汗出惡

風脉緩者名為中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗
出惡風而惡寒者衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以

街為陽街外者也病則不能衛固其外而皮腠疎故汗

出而惡風也傷寒脉緊傷風脉
緩者寒性勁急而風性解緩故也 太陽病或已發熱或未

發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

經曰
凡傷

於寒則為病熱為寒氣客於經中陽經滯結而成熱也
中風即發熱者風為陽也及傷寒云或已發熱或未發

熱以寒為陰邪不能熱鬱而方發熱也風則傷衛寒則
傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣

病者則脉沉而病者則脉浮風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆
者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒脉陰陽俱緊者

欽定四庫全書

傷寒論注釋

知其傷 傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐
寒也

若燥煩脉數急者為傳也

太陽主表一日則太陽受邪
至二日當傳陽明若脉氣微

而不傳陽明胃經受邪則惡寒邪傳裏者則變熱如
頗欲吐若煩躁脉急數者為太陽邪變熱傳於陽明

也 傷寒二三日陽明少陽證不見者為不傳也

傷寒二
三日無

陽明少陽證知邪不
傳止在太陽經中也 太陽病發熱而渴不惡寒者為溫

病 發熱而渴不惡寒者陽明也此太陽受邪知為
溫病非傷寒也積溫成熱所以發熱而渴不惡寒也 若發

汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脉陰陽俱浮自汗

出身重多眠睡鼻息必鼾語言難出若被下者小便不



利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癇時瘕瘕

若火重之一逆尚引日再逆促命期

傷寒發汗已則身涼若發汗已身灼

熱者非傷寒為風濕也風傷於上而陽受風氣風與濕相合則傷衛脈陰陽俱浮自汗出者衛受邪也衛者氣

也風則傷衛溫則傷氣身重多眠眩者衛受風濕而氣昏也鼻息必齟齬言難出者風濕外甚而氣擁不利也

若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也內經曰膀胱不利為癃不約為遺溺癃者小便不利也太陽之脈起自內

皆內經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕小便不利直視失溲為下後竭津液損藏氣風濕外勝經日

欲絕也為難治若被火者則火助風濕成熱微者熱溲而發黃劇者熱甚生風如驚癇而時瘕瘕也先曾被火

為一逆若更以火重之是再逆也一逆尚難延引時日而不愈其再逆者必致危殆故云促命期病有發

欽定四庫全書

傷寒論注釋

熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者

七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

陽為熱也

陰為寒也發熱而惡寒寒傷陽也無熱而惡寒寒傷陰也陽法火陰法水火成數七水成數六陽病七日愈者

火數足也陰病六日愈者水數足也太陽病頭痛至七日已上自愈者以

行其經盡故也若欲作再經者鍼足陽明使經不傳則

愈

傷寒自一日至六日傳三陽三陰經盡至七日當愈經曰七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽

之邪再傳陽明針足陽明為迎而奪之使經不傳則愈太陽病欲解時從巳至未

上

巳為正陽則陽氣得以復也始於太陽終於厥陰六經各以三時為解而太陽從亥至丑少陰從子至寅



厥陰從丑至卯者以陽行也。速陰行也。緩陽生於亥陰生於夜陽三經解時從寅至戌以陽道常緩也。陰三經解時從亥至卯以陰道常逆也。內經曰陽中之太陽通於夏氣則巳午未太陽乘主也。風家表解

而不了者十二日愈

中風家發汗解後未全快暢者
一二日大邪皆去六經悉和則

10

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也

身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

淺皮膚經

言深皮膚言外骨髓言內身熱欲得衣者
表熱裏寒也身寒不欲衣者裏寒表熱也

太陽中風陽

浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出
 齋齋惡寒漸

浙惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

陰陽
以以
候候
榮衛

欽定四庫全書

傷寒論注釋

陽脉浮者衛中風也陰脉弱者榮氣弱也風并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也晝晝者不足也惡寒之貌也漸所者洒淅也惡風之貌也衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮膚緩腠理疎是亦惡風也翕翕者焯焯然而熱也若合羽所覆言熱在表也且鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風邪也

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮
宋辛熟

芍藥

酸三
徽雨
寒味
苦

甘草

二兩 二兩
味甘 味甘
平 平

生薑

味三
辛兩
溫切

大棗

味甘溫 二枝 擘

內經曰辛甘發散為陽桂枝湯辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風浮所勝平以辛佐以苦甘以甘緩

之以收之是以桂枝為主芍藥甘草為佐也內經曰
風淫於內以甘緩之以辛散之是以生薑大棗為使
也

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆

令一時許遍身絳絳微似有汗者益佳不可令如水

流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑

若不汗更服依前法又不汗後服小促役其間半日

許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一

欽定四庫全書

傷寒論注釋

劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三

劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

頭痛者太陽也發熱

汗出惡風者中風也與桂枝湯解微風邪太陽病項背強几几反汗出惡風

者桂枝加葛根湯主之

几几者伸頸之貌也動則伸頸

項背几几者當無汗反汗出惡風者中風表虛也與桂

枝湯以和表加麻黃葛根以祛風且麻黃主表實後葛

根湯證云太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之
藥味正與此方同其無汗者常用麻黃今曰汗出惡不
加麻黃但太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方



用前法若不上衝者不可與之

太陽病屬表而反下之則虛其裏邪欲乘虛傳

裏若氣上衝者裏不受邪而氣逆上與邪爭也則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能

與邪爭邪氣已傳裏也故太陽病三日已發汗若吐若

下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脉

證知犯何逆隨證治之

太陽病三日中曾經發汗吐下之壞病言為醫所壞病也不可復與桂枝湯審

觀脉證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之桂枝本

為解肌若其人脉浮緊發熱汗不出者不可與也常須

識此勿令誤也

脉浮發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脉浮緊發熱汗不出者傷寒

欽定四庫全書

傷寒論注釋

也可與麻黃湯常須識此勿妄治也

若酒客病不可與桂枝湯得湯則嘔

以酒客不喜甘故也

酒客內熱喜辛而惡甘桂枝湯甘酒客得之則中滿而嘔喘家

作桂枝湯加厚朴杏仁

太陽病為譫語主氣風其氣擁則生喘也與桂枝湯以散

風加厚朴杏仁

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也

內熱

桂枝湯則吐如酒客之類也說亡津液又為熱所搏其後必吐膿血吐膿血謂之肺痿金匱要畧曰熱在上焦

為肺痿謂或從汗或從嘔吐重亡津液故得之

太陽病發汗遂漏不止其人惡

風小便難四支微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之

太陽病因發汗遂汗漏不止而惡風者為陽氣不足因發汗陽氣益虛而皮膚不固也內經曰膀胱者州都之



官津液藏焉氣化則出小便難者汗出亡津液陽氣虛弱不能施化四肢者諸陽之本也四肢微急難以屈伸者亡陽而脫液也針經曰液脫者骨弱屈伸不利與桂枝加附子湯以溫經復陽

太陽病下之

後脈促胃滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍

藥方中加附子湯主之

脈來數時一止復來者名曰促促為陽盛則不固下後而脈促

者也此下後脈促不得為陽盛也太陽病下之其脈促不結胃者此為欲解此下後脈促而復胃滿則不得為

欲解由下後陽虛表邪漸入而客於胃中也與桂枝湯以散客邪通行陽氣芍藥益陰陽虛者非所宜故去之

陽氣已虛若更加之微惡寒則太陽病得之八九日如必當溫經以散之故加附子

瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日

欽定四庫全書

傷寒論注釋

二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽

俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲

解也以其不能得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯

傷寒八九日則邪傳再經又過三陽欲傳三陰之時也傳經次第前三日傳過三陽至四日陽去入陰不入陰

者為欲解其傳陰經第六日傳過三陰為傳經盡而當解其不解傳為再經者至九日又過三陽陽不傳陰則

解如瘧發作有時也寒多者為病進熱多者為病退經曰厥少熱多其病為愈寒多者為病進熱多者為病退今

雖發熱惡寒而熱多寒少為陽氣進而邪氣少也裏不和者嘔而利今不嘔清便自調者裏和也寒熱間日發

也日二三發者邪氣微也內經曰大則邪至小則平言



桂枝二越婢一湯方	越婢一湯方	寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二	白虎加人參湯生津止渴和表散熱	解者表裏有熱不可更與桂枝湯若大汗出脉洪大而煩渴不	人參湯主之	服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加	邪	必解宜桂枝二麻黃一湯	脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出	經而泄風氣却與桂枝湯解散則愈	府却與桂枝湯則愈	除表邪	其汗以	邪氣外散皮膚而為痒也與桂枝麻黃各半湯小發	色者表未解也熱色為赤色也得心汗則和不得汗則	可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱	也陰裏也脉微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不	氣微緩也故云欲愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表	邪其則脉大邪少則脉微今日數多而脉微緩者是邪
桂枝二越婢一湯方	越婢一湯方	寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二	白虎加人參湯生津止渴和表散熱	解者表裏有熱不可更與桂枝湯若大汗出脉洪大而煩渴不	人參湯主之	服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加	邪	必解宜桂枝二麻黃一湯	脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出	經而泄風氣却與桂枝湯解散則愈	府却與桂枝湯則愈	除表邪	其汗以	邪氣外散皮膚而為痒也與桂枝麻黃各半湯小發	色者表未解也熱色為赤色也得心汗則和不得汗則	可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱	也陰裏也脉微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不	氣微緩也故云欲愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表	邪其則脉大邪少則脉微今日數多而脉微緩者是邪
桂枝二越婢一湯方	越婢一湯方	寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二	白虎加人參湯生津止渴和表散熱	解者表裏有熱不可更與桂枝湯若大汗出脉洪大而煩渴不	人參湯主之	服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者白虎加	邪	必解宜桂枝二麻黃一湯	脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出	經而泄風氣却與桂枝湯解散則愈	府却與桂枝湯則愈	除表邪	其汗以	邪氣外散皮膚而為痒也與桂枝麻黃各半湯小發	色者表未解也熱色為赤色也得心汗則和不得汗則	可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱	也陰裏也脉微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不	氣微緩也故云欲愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表	邪其則脉大邪少則脉微今日數多而脉微緩者是邪

大棗

四枚

麻黃

十八銖

石膏

二十四銖

胃為十二經之主，脾治水，故為卑藏。若脾內經曰：脾主為胃行其津液，是湯所以謂之越婢者，以發越脾氣，通行津液，外達方一。

名越婢湯，即此義也。

右七味，㕮咀，以五升水，煮麻黃一二沸，去上沫，內諸

藥，煮取二升，去滓，溫服一升。本方當裁為越婢湯，桂

枝湯合飲一升，今合為一方。桂枝二越婢一。

服桂枝湯，或下之，仍頭項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿

微痛，小便不利者，桂枝湯去桂，加茯苓、白朮，湯主之。

頭項強痛

欽定四庫全書

傷寒論注釋

翕翕發熱，雖經汗下，為邪氣仍在表也。心下滿微痛，小便不利者，則欲成結胸。今外證未罷，無汗，小便不利，則心

下滿微痛，為停飲也。與桂枝湯以解外，加茯苓、白朮，利小便，行留飲。傷寒脉浮，自汗出，小

便數，心煩微惡寒，脚攣急，反與桂枝湯，欲攻其表，此誤

也得之。便厥咽中乾，煩燥吐逆者，作甘草乾薑湯與之，

以復其陽。若厥愈足溫者，更作芍藥甘草湯與之，其脚

即伸。若胃氣不和，讞語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，

復加燒鍼者，四逆湯主之。

脉浮自汗出，小便數，而惡寒者，陽氣不足也。心煩脚攣急，

者，陰氣不足也。陰陽氣虛，則不可發汗。若與桂枝湯攻表，則又損陽氣，故為誤也。得之便厥咽中乾煩燥，

<p>吐逆者先作甘草乾薑湯復其陽氣得厥愈足溫乃與 芍藥甘草湯益其陰血則脚脛得伸陰陽雖復其有胃 燥誤語少與調胃承氣湯微瀉以和其胃重發汗為亡 陽加燒鍼則損陰內經曰榮氣微者加燒鍼則血不流 行重發汗復燒鍼是陰陽之氣 大虛四逆湯以復陰陽之氣</p>		<p>甘草乾薑湯方</p>		<p>甘草 四兩炙 味甘平 乾薑 二兩炮 味辛熱</p>		<p>內經曰辛甘發散為陽甘 草乾薑相合以復陽氣</p>		<p>右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服</p>		<p>芍藥甘草湯方</p>		<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>		<p>白芍藥 四兩苦 酸微寒 甘草 四兩炙 味甘平</p>		<p>芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以 收之甘以緩之酸甘相合用補陰血</p>		<p>右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分溫再服</p>		<p>之</p>		<p>調胃承氣湯方</p>		<p>大黃 四兩去皮 清酒浸 甘草 二兩炙 味甘平 芒硝 半升味鹹 苦大寒</p>		<p>內經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒以 除熱大黃苦寒以瀉實甘草甘平助二物推陳而緩中</p>		<p>右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上</p>	
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	----------	--	----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--



火微煮令沸少少溫服之

四逆湯方

甘草

二兩炙
味甘平

乾薑

一兩半
味辛熱

附子

一枚生用去皮
破八片辛大熱

內經曰寒淫於內治以甘熱又曰寒淫所勝平以辛熱甘草薑附相合為甘草大熱之劑乃可發散陰陽

氣之

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再

服強人可大附子一枚乾薑三兩

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘

欽定四庫全書

傷寒論注釋

急而譫語師曰至夜半手足當溫兩脚當伸後如師言

何以知此答曰寸口脉浮而大浮則為風大則為虛風

則生微熱虛則兩脰攣病證象桂枝因加附子參其間

增桂令汗出附子溫經亡陽故也厥逆咽中乾煩燥陽

明內結譫語煩亂更飲甘草乾薑湯夜半陽氣還兩足

當熱脰尚微拘急重與芍藥甘草湯爾乃脰伸以承氣

湯微澹則止其譫語故知病可愈

陽旦桂枝湯別名也前證脉微自汗

出小便微數心煩微惡寒脚攣急與桂枝湯證相似是證象陽旦也與桂枝湯而增劇得寸口脉浮大浮為風邪



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷三

金成無已注

辨太陽病脉證并治法中第六

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

太陽病項背強

汗出惡風者中風表虛也項背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也

葛根湯方

欽定四庫全書

傷寒論注釋

葛根

四兩

麻黃

三兩

桂

二兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

本草云經可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也

右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫

內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須

啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

傷寒有合病有併病

本太陽病不解併於陽明者謂之併病三經俱受邪相合病者謂之合病合病者邪氣其也太陽陽明合病者



<p>與太陽少陽合病陽明少陽合病皆言必自下利者以邪氣併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒邪氣其客於二陽二陽方外實而不主裏則裏氣虛故必下利與葛根湯以散經中其邪</p> <p>與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之</p> <p>陽不主裏裏氣不和氣下而不上者但下利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不下利與葛根湯以散其邪</p> <p>加半夏以逆氣</p>	<p>葛根加半夏湯方</p> <p>葛根 四兩 麻黃 三兩去節湯泡</p> <p>甘草 二兩 芍藥 二兩 桂枝 二兩去皮 大棗 十二枚擘</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>半夏 洗 半升</p> <p>右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗</p>	<p>太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之</p> <p>熱遂利桂枝證者邪在表也而反下之虛其陽胃為熱所乘遂利不止邪在裏則見陽脈邪在裏則見陰脈下利脈遲微邪在裏也促為陽盛雖下利而脈促者知表未解也病有汗出而喘者為自汗出而喘也即邪氣外其所致喘而汗出者為因喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃芩黃連湯散表邪除裏熱</p>
--	--	----------------------------	---	--



葛根黃芩黃連湯方

葛根

半斤

甘草

二兩炙

黃芩

二兩味

黃連

三兩味

內經曰甘發散為陽表未解者散以葛根甘草之甘苦以堅裏氣弱者堅以黃芩黃連之苦

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二

升去滓分溫再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘

者麻黃湯主之

此太陽傷寒也寒則傷榮頭痛身痛腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血

不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛者自汗出而

欽定四庫全書

傷寒論注釋

惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃湯方

麻黃

三兩味甘

桂枝

三兩去皮

甘草

一兩炙

杏仁

七十箇湯去皮尖味辛溫

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥

餘如桂枝法將息



太陽與陽明合病喘而胃滿者不可下宜麻黃湯主之

陽受氣於中喘而脅滿者陽氣不宜發壅而逆也心下滿腹滿皆為實當下之此以為脅滿非裏實故不可

下雖有陽明然與太陽合病
為屬表是與麻黃湯發汗

太陽病十日已去脉浮細

而嗜卧者外已解也設脅滿脇痛者與小柴胡湯脉但

浮者與麻黃湯

浮而不細者則邪氣但在太陽中風脉浮緊發熱惡寒也與麻黃湯發散之

身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗

出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也大

欽定四庫全書

青龍湯主之

強衛弱今風寒雨傷則榮衛俱實故不汗出而煩躁也

者為榮衛俱虛反服青龍湯則必亡陽或生厥逆筋惕

肉曜也

大青龍湯方

麻黃
味甘溫
桂枝
味辛熱
甘草
味甘平

杏仁 十四箇去皮生薑 三兩切
大棗 十二枚擘

石膏如雞子大微寒味甘

麻黃 味甘溫 二兩去節
桂枝 味辛熱 二兩去皮
甘草 味甘平 二兩炙

杏仁 十四箇去皮生薑 三兩切
大棗 十二枚擘

石膏如雞子大
微寒石味甘



<p>辛甘均為發散然風宜辛散寒宜甘發以辛甘相合乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發散榮中之寒桂枝芍藥以解除衛中之風</p>	<p>右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥</p>	<p>煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉</p>	<p>粉之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不</p>	<p>得眠也</p>	<p>傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青</p>	<p>龍湯發之<small>此傷寒見風脉也傷寒者身疼此以風勝故身不疼中風者身重此以兼風故乍有輕時</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>不久厥吐利無少陰裏證者為風寒外傷寒表不解心</p>	<p>其也與大青龍湯以發散表中外風寒</p>	<p>下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利</p>	<p>少腹滿或喘者小青龍湯主之<small>傷寒表不解心下有水飲則水寒相搏肺寒氣逆故乾嘔發熱而咳針經曰形寒飲冷則傷肺以其兩</small></p>	<p>逆故乾嘔發熱而咳針經曰形寒飲冷則傷肺以其兩</p>	<p>寒相感中外皆傷故氣逆而上行此之謂也與小青龍</p>	<p>湯發汗散水水氣內漬則所傳不一</p>	<p>故有或為之證隨證增損以解化之</p>	<p>小青龍湯方</p>	<p>麻黃 三兩 去節 芍藥 三兩 微寒 五味子 半升 味</p>	<p>乾薑 三兩 味 甘草 三兩 平 細辛 三兩 味</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	--	-------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---	--



桂枝

三兩去皮

半夏

半斤湯洗

寒邪在表非甘辛不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣滯內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以行水氣而潤腎氣逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升

加減法 若微利者去麻黃加芫花如雞子熱令赤色下利者不可攻其表汗出必脹滿麻黃發其陽水漬入胃必作利芫花下十二水水去利則止 若渴者去半夏加栝蒌根三兩辛燥而苦潤半夏辛而燥

欽定四庫全書

傷寒論注釋

津液非渴者所宜故去之栝蒌味苦而生津液故加之 若壅者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人即拘加附子溫散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐蛇去麻黃惡發汗 若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水瀉下焦不行為小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄瀉水於下加所當也 若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要畧曰其人形腫故不內麻黃內杏子以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此

寒去欲解也小青龍湯主之

欬而微喘者水寒射肺也發熱不渴者表證未罷也

與小青龍湯發表散水服湯已渴者寒氣溫水氣散為欲解也 太陽病外證未解脉浮



弱者當以汗解宜桂枝湯

脉浮弱者榮弱衛強也

太陽病下之微

喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

下後大喘則為裏氣

大虛邪氣傳裏正氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏仁

以下逆氣太陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外

者宜桂枝湯主之

經曰本發汗而復下之為逆也若先發汗治不為逆

太陽病先

發汗不解而復下之脉浮者不愈浮為在外而反下之

故令不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯

主之

經曰柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆則其類矣太

欽定四庫全書

傷寒論注釋

陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在

此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄

乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

脉浮緊無汗發熱身疼痛

太陽傷寒也雖至八九日而表證仍在亦當發其汗既

服溫藥發散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也

邪氣不為汗解鬱而變熱蒸於經絡發於肌表故生熱

煩肝受血而能視始者寒氣傷榮寒既變熱則血為熱

持肝氣不治故目瞑也劇者熱甚於經迫血妄行而為

衄得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃

湯以解前太陽

傷寒之邪也太陽病脉浮發熱身無汗自衄者愈

風寒在經不得汗解鬱而變熱

二陽併病太陽初得病



時發其汗汗先出不微因轉屬陽明續自微汗出不惡
寒若太陽病證不罷者不可下下之為逆如此可小發
汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若
發汗不微不足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁
煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短
氣但坐以汗出不微故也更發汗則愈何以知汗出不
微以脉濇故知也太陽病未解傳併入陽明而太陽證
未罷者名曰併病續自微汗出不惡
寒者為太陽證罷陽明證具也法當下之若太陽證未
罷者為表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明
欽定四庫全書
傷寒論注釋
之經循而色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏
之以取其汗若發汗不微者不足言陽氣怫鬱止是當
汗不汗陽氣不得越散邪無從出極甚於經故躁煩也
邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可
得而短氣但責以汗出不微更發汗則愈內經曰諸過
者切之濇者陽氣有餘為身熱無汗是以脉濇知陽氣
擁鬱而汗
出不微 脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸
者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏
虛須表裏實津液自和便自汗出愈經曰諸脉浮數當
發熱而濇者惡寒
言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其
津液虛其胃氣若身重心悸而尺脉實者則下後裏虛
邪氣乘虛傳裏也今尺脉微身重心悸者知下後裏虛
津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則不



可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解

之假令尺中遲者不可發汗何以知其然以榮氣不足

血少故也

針經曰奪血者無汗尺脉遲者為榮血不足故不可發汗脉浮者病在表

可發汗宜麻黃湯

浮為經手得之以候皮膚之氣内經曰其在皮者汗而發之脉浮

而數者可發汗宜麻黃湯

浮則傷衛數則傷榮榮衛受邪為病在表故當汗散病

常自汗出者此為榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣

和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛和則

愈宜桂枝湯

風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛既客邪則不能與榮氣

欽定四庫全書

傷寒論注釋

和諧亦不能衛護皮膚是以常自汗出病人藏無他病

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗

則愈宜桂枝湯主之

藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表病汗之則愈所

謂先其時者先其發熱汗出之時發汗則愈

傷寒脉浮緊不發汗因致衄者

麻黃湯主之

傷寒脉浮緊邪在表也當與麻黃湯發汗若不發汗則邪無從出掃其於經迫血妄

行因致

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其

小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必

衄宜桂枝湯

不大便六七日頭痛有熱者故宜當下若小便清者知裏無熱則不可下經曰小便



<p>數者大便必鞭不更衣十日無所苦也況此不大便六七日小便清者不可責邪在裏是仍在表也與桂枝湯以解外若頭疼不已為表不能醫其於經迫血妄行上為衄也傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝湯主之<small>煩者熱也發汗身涼為已解至</small></p> <p>此日許身復熱脈浮數者邪<small>凡病若發汗若吐若下若不盡也可更發汗與桂枝湯</small></p> <p>亡津液陰陽自和者必自愈<small>重亡津液則不能作汗必待陰陽自和乃自愈矣</small></p> <p>大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必自愈<small>因亡津液而小便不利者不可以藥利之俟津液足小便利必自愈也</small></p> <p>下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛故也<small>發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血振寒者陽氣微也脈微細者陰血弱也</small></p> <p>發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大熱者乾薑附子湯主之<small>下之虛其表裏虛又汗則表裏俱虛陽王於晝陽欲復虛不勝邪正邪交爭故晝日煩躁不得眠夜陰王陽虛不能與之爭是夜則安靜不嘔不渴者裏無熱也身無大熱者表無熱也又無表證而脈沈微知陽氣大虛陰寒氣勝與乾薑附子湯</small></p> <p>退陰復陽</p>	<p>乾薑附子湯方</p>	<p>乾薑<small>一兩味</small></p> <p>附子<small>一枚生用去皮破</small></p>
---	---------------	---



內經曰寒淫所勝平以辛熱虛寒大甚是以辛熱劑勝之也

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人

參三兩新加湯主之

汗後身疼痛邪氣未盡也脉沈遲榮血不足也經曰其脉沈者榮氣

微也又曰遲者榮氣不足血少故也與桂枝湯以解未盡之邪加芍藥生薑人參以益不足之血發汗

後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏

仁甘草石膏湯主之

發汗後喘當作桂枝加厚朴杏仁湯汗出則喘愈今汗出而喘為邪

氣搏甚桂枝湯不能發散故不可更行桂枝湯汗出而喘有大熱者內熱氣其也無大熱者表邪必甚也與麻

欽定四庫全書

傷寒論注釋

黃杏仁甘草石膏湯以散其邪

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃

四兩去節

杏仁

五十箇去皮

甘草

二兩炙

石膏

半斤碎綿

內經曰肝苦急急食甘以緩之風氣通於肝風邪外甚故以純甘之劑發之

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升去滓溫服一升本云黃耳杯

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘



草湯主之

發汗過多亡陽也陽受氣於胃中胃中陽氣不足故病又手自冒心心下悸欲得按者與

桂枝甘草湯以調不足之氣

桂枝甘草湯方

桂枝

四兩去皮味辛熱

甘草

二兩炙味甘平

桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而緩中

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗

湯主之

汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動也腎之積名曰奔豚發則從少腹上至心

欽定四庫全書

傷寒論注釋

下為腎氣逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓

半斤味甘平

甘草

二兩炙味甘平

大棗

十五枚擘味甘平

桂枝

四兩去皮

茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣煎用甘爛水者揚之無力取不助腎也

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮

取三升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二



斗置大盆內以杓揚之水上珠子伍六千顆相逐
取用之

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之

腹脹與下後腹滿皆為實言邪氣乘虛入裏為實發汗後外已解也腹脹滿知非裏實由脾胃津液不足氣滯不通壅而為滿與此湯和脾胃而降氣

厚朴生薑甘草半夏人參湯方

厚朴

半斤去皮
炙味苦溫

生薑

半斤切
味辛溫

半夏

半升洗
味辛平

人參

一兩味
甘溫

甘草

二兩炙
味甘平

欽定四庫全書

傷寒論注釋

內經曰脾欲緩急食甘以緩之月苦泄之厚朴之苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑之辛以散滯氣

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脉沈

緊發汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯

主之

吐下後裏虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胃表虛

緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷陽氣

益和陽

湯氣外虛則不能主持於脉身為振振搖也與此湯以



茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓

四兩 味甘平

桂枝

三兩 去皮 味辛熱

白朮

二兩 味苦甘溫

甘草

二兩 炙 味甘平

陽不足者補之以甘茯苓白朮生津液而益湯也氣逆者散之以辛桂枝甘草行湯散氣

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗病解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解又反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛

惡寒則衛虛與芍藥甘草附子湯以補榮衛

欽定四庫全書

傷寒論注釋

芍藥甘草附子湯方

芍藥

三兩 味酸微寒

甘草

三兩 炙 味甘平

附子

一枚 炮去皮破 八片 味辛熱

芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而稍衛甘草之甘調和辛酸而安正氣

已上三味以水五升煮取一升伍合去滓分溫服疑

非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

發汗若下

病宜解也若病仍不解則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以復

陰陽之氣



<p>茯苓四逆湯方</p>	<p>茯苓 <small>六兩 味甘平</small> 人參 <small>一兩 味甘溫</small> 附子 <small>一枚 生用 去皮 破八片 味辛熱</small></p>	<p>甘草 <small>二兩 炙 味甘平</small> 乾薑 <small>一兩 半 味辛熱</small></p>	<p><small>四逆湯以補陽加 茯苓人參以益陰</small></p>	<p>右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服</p>	<p>發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣</p>	<p>與調胃承氣湯 <small>汗出而惡寒者表虛也汗出而不惡寒 但熱者裏實也經曰汗出不惡寒者此</small></p>	<p><small>表解裏未和與調 胃承氣湯和胃氣</small> 太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥</p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉</p>	<p>浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之 <small>發汗已解胃 中乾煩燥不</small></p>	<p><small>得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脉浮者表 未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微 熱消渴者熱未成實上焦燥 也與五苓散生津液和表裏</small></p>	<p>五苓散方</p>	<p>猪苓 <small>十八銖 味甘平</small> 澤瀉 <small>一兩 六銖 半 味酸 鹹</small> 茯苓 <small>十八銖 味甘平</small></p>	<p>桂 <small>半兩 去皮 味辛熱</small> 白朮 <small>十八銖 味甘平</small></p>	<p><small>淡者一也口入一兩為甘甘甚而反淡甘緩而淡滲 猪苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液鹹味下</small></p>
---------------	---	--	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------	--	---	-------------	---	---	---

欽定四庫全書

傷寒論注釋

<p>泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘 發散為陽桂枝之辛甘以和肌表</p>	<p>右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水</p>	<p>汗出愈</p>	<p>發汗已脉浮數煩渴者五苓散主之 <small>發汗已脉浮數者表邪未盡也煩渴</small></p>	<p>亡津液胃燥也與 五苓散和表潤燥傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴</p>	<p>者茯苓甘草湯主之 <small>傷寒汗出而渴者亡津液胃燥邪氣漸傳裏也五苓散以和表裏若</small></p>	<p>汗出不渴者邪氣不傳裏但在表而 表虛也與茯苓甘草湯和表合衛</p>	<p>茯苓甘草湯方</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>茯苓 二兩 味甘平 桂枝 二兩 去皮 味辛熱 生薑 三兩 切 味辛溫</p>	<p>甘草 一兩 炙 味甘平</p>	<p>茯苓甘草之甘滋津液而和衛 桂枝生薑之辛助陽氣而解表</p>	<p>右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服</p>	<p>中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴飲水水入</p>	<p>則吐者名曰水逆五苓散主之 <small>中風發熱至六七日則當解若不解煩者邪在</small></p>	<p>表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能消水水入則不 吐裏熱少則不能消水停積不散飲而吐水也以其因</p>	<p>水而吐故名水逆與五 苓散和表裏散停飲 未持脉時病人手叉自冒心師</p>
--	-----------------------------	------------	---	--	---	---	---------------	-------------------------	---	--------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---	--	--



<p>因教試令效而不效者此必兩耳聾無聞也所以然者</p>	<p>以重發汗虛故如此</p>	<p>不足也又試令效而不即效者耳聾也知陽氣</p>	<p>虛明矣耳聾者陽氣虛精氣不得上通於耳故也發汗後</p>	<p>飲水多必喘以水灌之亦喘</p>	<p>喘肺也發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>
<p>發汗多亡陽胃中陽氣不足者病</p>	<p>人手又自胃心師見外證知陽氣</p>	<p>不得上通於耳故也</p>	<p>喘肺也發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>
<p>因教試令效而不效者此必兩耳聾無聞也所以然者</p>	<p>以重發汗虛故如此</p>	<p>不足也又試令效而不即效者耳聾也知陽氣</p>	<p>虛明矣耳聾者陽氣虛精氣不得上通於耳故也發汗後</p>	<p>飲水多必喘以水灌之亦喘</p>	<p>喘肺也發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>不止發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>
<p>發汗多亡陽胃中陽氣不足者病</p>	<p>人手又自胃心師見外證知陽氣</p>	<p>不得上通於耳故也</p>	<p>喘肺也發汗後水灌之亦喘傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>	<p>傷肺也以冷水灌洗而喘</p>



若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯

主之少氣者熱傷氣也加甘草以益氣嘔者熱煩而氣

者甘以補之可也嘔則氣為熱搏逆而不散者辛以散之可也發汗若下之而煩熱胃

中窒者梔子豉湯主之陽受氣於胃中發汗若下使湯

散故煩熱而胃中窒與梔子豉湯以吐胃中之邪傷寒五六日大下之後身熱

不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之傷寒五六

裏之時若大下後身熱去心胃空者為欲解若大下後

身熱去而心結痛者結胃心身熱不去心中結痛者虛

煩也結胃為熱客胃中為實是熱氣已收飲於內則外

身熱去虛煩為熱客胃中未結為實散漫為煩是以身

欽定四庫全書傷寒論注釋

熱不去六七日為欲解之時以熱為虛煩傷寒下後心

煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之下後但腹滿而

人裏為裏實但心煩而不腹滿即邪氣在胃中為虛煩

既煩且滿則邪氣壅於胃腹之間也滿則不能坐煩則

不能卧故令卧起不安與梔子厚朴湯吐煩泄滿

梔子厚朴湯方

梔子十四枚擘厚朴四兩枳實四枚水浸去

酸苦湯泄梔子之苦以泄腹滿

厚朴炙苦溫枳實穰妙味苦寒

已上三味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫



進一服得吐者止後服

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯

主之丸藥不能除熱但損正氣邪氣乘虛留於胃中而未入深者則身熱不去而微煩與梔子乾薑湯吐

煩益氣

梔子乾薑湯方

梔子

十四枚擘

乾薑

二兩味

苦以湧之梔子之苦以吐煩
辛以潤之乾薑之辛以耗氣

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進

欽定四庫全書

傷寒論注釋

一服得吐者止後服

凡用梔子湯病人舊微瀉者不可與服之

病人舊微瀉者裏虛而寒

在下也雖煩則非瀉熱故不可與梔子湯內經曰先泄而後生他病者治其本必且調之後乃治其他病太

陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動

振振欲擗地者真武湯主之

發汗不解仍發熱邪氣未解也心下悸頭眩身瞤動

振振欲擗地者汗出亡陽也裏虛為悸上虛為眩

乾燥者不可發汗

津液不足也

淋家不可發汗發汗必便血

膀胱衰熱則淋反以湯藥發汗亡耗



可發汗發汗則瘥

表虛聚熱則生瘡瘡家身疼如傷寒不可發汗發汗則表氣愈虛熱勢愈

其生風故

變瘥也 衄家不可發汗汗出必額上陷脈急緊直視

不能眴不得眠

衄者上焦亡血也若發汗則上焦津液枯竭經絡乾澀故額上陷脈急緊諸脈

者皆屬於目筋脈緊急則牽引其目故直視不能眴而瞬合目也針經曰陰氣虛則目不眩亡血為陰虛是以

不得亡血家不可發汗發汗則寒慄而振 針經曰奪汗者無汗奪汗

者無血無血發汗則陰陽俱虛故寒慄而振 汗家重發汗必恍惚心亂小便

已陰疼與禹餘糧圓闕 汗者心之液汗家重發汗則心虛恍惚心亂奪汗則無水故小

便已陰中疼 病人有寒復發汗胃中冷必吐衄 病人有寒則當溫散反發

欽定四庫全書

傷寒論注釋

汗振陽氣胃中冷必吐衄也 本發汗而復下之此為逆也若先發汗

治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治不為

逆 病在表者汗之為宜下之為逆病在裏者下之為宜汗之為逆經曰陽盛陰虛汗之則死下之則愈陽虛

陰盛汗之則愈下之則死 傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛

者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜

四逆湯救表宜桂枝湯 傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏者以裏氣

不足必先救之急與四逆湯得清便自調知裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼者表邪也內經曰病發

而不足標內本之先治其標 病發熱頭痛脈反沈若不



差身體疼痛當救其裏宜四逆湯

發熱頭痛表病也脈反沈者裏脈也經曰

表有病者脈當浮大今脈反以遲故知愈也見表病而得裏脈則當差若不差為內虛寒甚也與四逆湯救其

裏太陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其

人因致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也得

裏和然後復下之

冒者鬱也下之則裏虛而亡血汗之則表虛而亡陽表裏俱虛寒氣滯鬱

其人因致冒金匱要畧曰亡血後汗寒多故令鬱冒汗出則沸鬱之邪得解則胃愈金匱要畧曰冒家欲解必

大汗出汗出表和而裏未和者然後復下之

太陽病未解脈陰陽俱停必先

振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微者

欽定四庫全書

傷寒論注釋

下之而解若欲下之宜調胃承氣湯主之

脈陰陽俱停無偏勝者陰

陽氣和也經曰寸口關上尺中三處大小浮沈遲數同等此脈陰陽為和平雖劇當愈今脈陰陽既和必先振

慄汗出而解但陽脈微者陽不足而陰有餘也經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脈微者陰不足而陽有餘也經曰

陽虛陰虛下之則愈太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗

出欲救邪風者宜桂枝湯

太陽中風風侯於衛則衛實而榮虛榮者陰也衛者陽也

發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必濇之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛傷

寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心

煩喜嘔或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭



欽定四庫全書		傷寒論注釋		小柴胡湯方	
必不能食也邪在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔		食邪在裏則不能食不欲食者邪在表裏之間也邪在表則能		靜然然者邪方自表之裏在表裏之間也邪在表則能	
表則呻吟不安邪在裏則煩悶亂內經曰陽入之陰則		心腹滿言胃膈苦滿知邪氣在表裏之間也然然靜也邪在		腹脹滿今止言胸膈苦滿知邪氣在表裏之間也然然靜也邪在	
處是以寒熱往來也邪在表則心腹不滿邪在裏則心		左表則寒邪在裏則熱今邪在表半表半裏之間未有定		寒再中風中風復傷寒也經曰傷寒中風有柴胡證但	
見一證便是不必悉具者正是謂或中風或傷寒也邪		風五六日傷寒往來寒熱即至五六日也玉函曰中		胡主之病有在表者有在裏者有在表裏之間者此邪	
自表傳裏之時中風者或傷寒至五六日也玉函曰中		或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與小柴		柴胡	
甘草		黃芩		人參	
半夏		生薑		大棗	
內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以發傳		邪之熱氣不足者以甘緩之參甘草之甘以緩中		和之氣邪半入裏則氣逆辛以散之半夏以除煩	
嘔邪在半表則榮衛爭之辛甘解之蓮棗以和榮衛					



右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升
溫服一升日三服 後加減法

若胃中煩而不嘔去半夏人參加括蕢實一枚胃中煩而不嘔

熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用人參之

稍辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛溫熱宜寒療聚宜

苦括蕢實苦寒若渴者去半夏加人參合前成四兩半

以泄胃中蘊熱括蕢根四兩半夏煨津液非渴者所宜人參甘而潤

腹中痛者去黃芩加芍藥三兩去黃芩惡寒中若脇下

痞鞭去大棗加牡蠣四兩甘令人中滿痞者去大棗之

鹹以與之痞鞭者加牡蠣

欽定四庫全書 傷寒論注釋

之 若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩飲而水

為悸小便不利內經曰腎欲堅急食苦以堅腎則水

流堅故去黃芩淡味滲泄為陽茯苓甘淡以泄伏水若

不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈渴不

者表未解也故去人參外有微若欬者去人參大棗生薑

熱表未解也加桂以發汗加五味子半升乾薑二兩欬者氣逆也甘則壅氣故去

食酸以收之五味子之酸以收逆氣肺寒血弱氣盡腠

則欬散以辛熱故易生薑以乾薑之熱也理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來

寒熱休作有時默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪



<p>渴者小柴胡湯主之</p> <p><small>身熱惡風頸項強者表未解也脇下滿而渴者裏不和也邪在表則</small></p>	<p>也</p> <p><small>傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而</small></p>	<p><small>不識</small></p> <p><small>聚而嘔皆非小柴胡湯所宜二者皆柴胡湯之戒不可</small></p>	<p><small>者為水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食穀者物</small></p> <p><small>若本因飲而嘔者水停心下也金匱要畧曰先渴却嘔</small></p>	<p><small>湯又走瀉液後必下重也不因飲水而嘔者柴胡湯證</small></p> <p><small>本柴胡湯證然以裏虛下焦氣澀而小便難者內亡津液雖</small></p>	<p><small>忌黃也頸項強者表仍未解也小便難者內亡津液雖</small></p> <p><small>能食而脇下滿痛胃虛為熱蒸之熏發於外面目及身</small></p>	<p><small>為實反二三下之虛其胃氣損其津液邪蒸於裏故不</small></p> <p><small>湯不中與也食穀者嘔</small></p>	<p><small>得病六七日脈遲浮弱惡風寒</small></p> <p><small>小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者柴胡</small></p>	<p><small>欽定四庫全書</small></p> <p><small>傷寒論注釋</small></p>	<p><small>醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強</small></p> <p><small>裏邪傳於陽明</small></p>	<p><small>也</small></p> <p><small>以陽明治之得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫</small></p>	<p><small>邪服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之</small></p> <p><small>服小柴胡湯</small></p>	<p><small>之</small></p> <p><small>相搏逆而上行故使嘔也與小柴胡湯以解半表半裏</small></p>	<p><small>高痛下故使嘔也小柴胡湯主之</small></p> <p><small>人之氣血虛時則為</small></p>
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	--



手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足溫者知邪在表裏之間也與小柴胡湯以解表裏之邪傷寒陽	脉澀陰脉弦法當腹中急痛者先與小建中湯不差者	與小柴胡湯主之有虛寒治之與小建中湯溫中散寒	若不差者非裏寒也必白邪氣自表之裏裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除傳裏之邪	小建中湯方	桂枝 三兩去皮 甘草 三兩炙 大棗 十二枚擘	芍藥 六兩 生薑 二兩切 膠飴 一升	建中者建脾也內經曰脾欲緩急食甘以緩之膠飴大棗甘草之甘以緩中也辛潤散也榮衛不足調而	欽定四庫全書	傷寒論注釋	散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收也泄也正氣虛弱收而行之芍藥之酸以收正氣	右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火	消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故	也	傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具	在表裏之間也或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬但	見一證便宜與柴胡湯治之凡柴胡湯病證而下之若柴	胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而
---	-----------------------	-----------------------	---	-------	------------------------	--------------------	--	--------	-------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	---	--------------------	---	------------------------	-----------------------



解邪在半表半裏之間為柴胡證即未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不為逆可復與柴胡湯以和解之得湯邪氣還表者外作蒸蒸而熱先經下裏虛邪氣欲出內則振振然也正氣勝陽氣生却後發熱汗出		傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之而解也		傷寒二三日邪氣在表未嘗傳裏之時心中悸而煩是非邪氣傳所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先建其裏		太陽病過經十餘日反二三下之後四五		日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱		微煩者為未解也與大柴胡下之則愈		日數過多累經攻下而柴胡證不能者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不能者後與柴胡湯是也嘔止		欽定四庫全書		傷寒論注釋		者表裏和也若嘔不止鬱鬱微煩者裏熱已甚結於胃中也與大柴胡湯下其裏熱則愈		大柴胡湯方													
柴胡		半斤味		黃芩		三兩味		芍藥		三兩味		枳實		四枚炙		生薑		五兩切		半夏		半升洗		大棗		十二枚擘		柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦瀉泄而扶陰辛者散也半下之辛以散逆氣辛甘和也益		以和榮衛		右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一	

升日三服一方用大黃二兩若不加大黃恐不為大
柴胡湯也

傷寒十三日不解胃脘滿而嘔日晡所發潮熱已而微

利此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以圓藥

下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後

以柴胡加芒硝湯主之

傷寒十三日再傳經盡當解之時也若不解胃脘滿而嘔者邪

氣猶在表裏之間此為柴胡湯證若以柴胡湯下之則更無潮熱自利醫反以丸藥下之虛其陽胃邪熱乘虛

入府日晡所發潮熱已而利也潮熱雖為熱實然胃腸之邪未已故先與小柴胡湯以解外後以柴胡加芒

欽定四庫全書

傷寒論注釋

硝以下 傷寒十三日不解過經譫語者以有熱也當以

湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脉調和者知

醫以丸藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反

和者此為內實也調胃承氣湯主之

傷寒十三日再傳經盡謂之過經譫

語者陽明胃熱也當以諸承氣湯下之若小便利者津液偏滲大便秘鞭反下利者知醫以丸藥下之也下利

脉微而厥者虛寒也今脉調和則非虛寒由腸虛胃熱協熱而利也與調胃承氣湯以下胃熱 太陽病

不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者

尚未可攻當先解外外解已但少腹急結者乃可攻之



宜桃核承氣湯方

太陽膀胱經也太陽邪熱不解隨經

至於狂但不寧而經曰其人如狂者以熱在下焦太陽
多熱熱在膀胱必與血相搏若血不為畜為熱迫之則
血自下血下則熱隨血出而愈若血不下者則血為熱
搏畜積於下而少腹急結乃可攻之與桃核承氣湯下
熱散血內經曰從外之內而盛於內
者先治其外後調其內此之謂也

桃核承氣湯方

桃仁

五十箇去皮
尖味甘平

桂枝

二兩去皮
味辛熱

大黃

四兩

芒硝

二兩

甘草

二兩
炙

甘以緩之辛以散之少腹急結緩以桃人之甘下焦
畜血散以桂枝之辛大熱之氣寒以取之熱其搏血

欽定四庫全書

傷寒論注釋

故加二物於調
胃承氣湯中也

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火
微沸下火先食溫服五合日三服當微利

傷寒八九日下之曾滿煩驚小便不利譫語一身盡重

不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒八九日邪

傳陽經之時下之虛其裏而熱不除胃滿而煩者陽熱
客於胃中也驚者心惡熱而神不守也小便不利者裏
虛津液不行也譫語者胃熱也一身盡重不可轉側者
陽氣內行於裏不營於表也與柴胡湯以除胃滿而煩
加龍骨牡蠣鈎鈎片收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津液
利小便加大黃以逐胃熱止譫語加桂枝以行陽氣而



解身重錯雜之
 邪斯悉愈矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏 二合 大棗 六枚 柴胡 四兩 生薑 一兩

人參 一兩 龍骨 半兩 鈎丹 半兩 桂枝 一兩 去皮

茯苓 半兩 大黃 二兩 牡蠣 半兩 熬

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更
 煮一二沸去滓溫服一升

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺

欽定四庫全書

傷寒論注釋

期門

腹滿譫語者脾胃疾也浮而緊者肝脉也脾病見肝脉木行乘土也經曰水行乘火木行乘土名曰

縱刺之以寫肝經盛氣 傷寒發熱噦噦惡寒大渴欲

飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也

名曰橫刺期門

傷寒發熱噦噦惡寒肺病也大渴欲飲水肝氣勝也傷寒欲飲水者愈若不愈而腹滿者此

是知肝氣勝也傷寒欲飲水者愈若不愈而腹滿者此

肝行乘肺水不得行也經曰水行乘金名橫刺期門以

通外作自汗出內為小便利而解也 太陽病二日反

躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必發
 譫語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗從腰



已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便

鞭小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人

足心必熱穀氣下流故也

太陽病二日則邪在表不當發躁而反躁者熱氣行於裏

也反熨其背而發汗大汗出則胃中乾燥火熱入胃胃

中燥熱躁煩而譫語至十餘日振深自下利者火邪勢

微陰氣復生津液得復也故為欲解火邪去大汗出則

愈若從腰以下不得汗則津液不得下通故欲小便不

得熱氣上逆而反嘔也欲失溲足下惡風者氣不得通

於下而虛也注液偏滲令大便澀者小便當數經曰小

便數者大便必澀也此以火熱內燥津液不得下通故

小便不數及不多也若火熱消津液和則結鞭之便得

潤因自大便也便已頭卓然而痛者先大便鞭則陽氣

不得下通既得大便則陽氣降下頭中陽虛故卓然而

欽定四庫全書

傷寒論注釋

痛氣者陽氣也先陽氣不通於下之時足下惡風今陽氣得下故足心熱也

太陽病中風以

火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏

灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭

身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛

或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小

便利者其人可治

風為陽邪因火熱之氣則邪風愈甚迫於血氣使血氣流溢失其常度風

與火氣謂之內陽兩陽相熏灼熱發於外必發身黃若

熱搏於經絡為陽盛外熱迫血上行必衄熱搏於內者

為陰虛內熱必小便難若熱消血氣少為陰陽俱

虛血氣虛少不能榮於身體為之枯燥三陽經絡至頸



<p>三陰至胃中而還但頭汗出刺頭而還者熱氣炎上搏陽而不搏於陰也內經曰諸脹腹大皆屬於熱咽微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內發上為口乾咽燥者火熱上炎也熱氣上而不下者則大便不鞭若熱氣下入胃消耗津液則大便鞭故云或不大便久則胃中燥熱必發譫語內經曰病深者其聲喘火氣大甚正氣逆亂則喘內經曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實火熱大甚故手足躁擾捻衣摸牀投亂也小便便利者為火未劇津液未竭</p> <p>傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂而猶可治也</p>	<p>起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之</p> <p>傷寒脈浮貢邪在表醫以火劫發汗汗出大出者亡之其陽汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內迫則心神浮越故驚狂起卧不安與桂枝湯解未盡表邪去芍藥以芍藥陰非亡陽所宜也火邪錯逆加蜀漆</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p> <p>之幸以散之陽氣亡脫加龍骨牡蠣之瀝以固之本草云瀝可去脫龍骨牡蠣之瀝是也</p>	<p>桂枝湯去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之</p>	<p>桂枝 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 牡蠣 五兩 炙 切 味 酸 鹹</p>	<p>龍骨 四兩 味 甘 平 大棗 十二枚 蜀漆 三兩 洗 去 腥 味 辛 平</p>	<p>右為末以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升</p>	<p>形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈</p> <p>形作傷寒謂頭痛身熱也脈不弦緊則無傷寒</p>
---	---	--	---------------------------	--	---	--------------------------------------	--



<p>表脉也經曰諸弱發熱則脉弱為氣熱故云弱者必渴若被火氣兩熱相合搏於胃中胃中燥煩必發譫語脉</p>	<p>弱發熱者得脉浮為邪太陰病以火熏之不得汗其人</p>	<p>必躁到不解必清血名為火邪<small>此火邪迫血而血下行者也太陽病用火熏之</small></p>	<p>不得汗則熱無從出陰虛被火必發躁也六日傳經盡至七日再到太陽經則熱氣當解若不解熱氣迫血下</p>	<p>行必清血<small>清濁也</small>脉浮熱甚反灸之此為實實以虛治因火而</p>	<p>動必咽燥唾血<small>此火邪迫血而血上行者也脉浮熱其為表實醫以脉浮為虛用火灸之因火</small></p>	<p>行故咽燥唾血<small>氣動血迫血上行故咽燥唾血</small>微數之脉慎不可灸因火為邪則為煩</p>	<p>逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋</p>	<p>欽定四庫全書<small>傷寒論注釋</small></p>	<p>血難復也<small>微數之脉則為熱也灸則除寒不能散熱是慎不可灸也若反灸之熱因火則甚遂為煩逆</small></p>	<p>灸本以追虛而復逐熱為實然則傷血又加火氣使血散脉中氣主响之血主濡之氣血消散不能濡潤筋骨</p>	<p>致骨焦筋傷血散而難復也脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因</p>	<p>火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也<small>脉浮在表宜以汗解之醫</small></p>	<p>以火灸取汗而不得汗邪無從出又加火氣相助則熱愈其身半以上同天之陽半身以下同地之陰火性炎</p>	<p>上則腰已下陰氣獨治故從腰以下必重而痺也欲自解者必當先煩乃有汗</p>	<p>而解何以知之脉浮故知汗出解也<small>煩熱也邪氣還表則為煩熱汗出而</small></p>	<p>解以脉浮故為邪還表也燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發</p>
---	------------------------------	--	---	--	--	---	------------------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------



<p>奔豚氣從少腹上衝心者炙其核上各一壯與桂枝加</p>	<p>桂湯更加桂二兩<small>燒針發汗則損陰血而驚動心氣針處被寒氣聚而成核心氣因驚而盛</small></p>	<p>腎氣乘寒氣而動發為奔豚金匱要畧曰病有奔豚從驚發得之腎氣欲上乘心故其氣從少腹上衝心也先</p>	<p>炙核上以散其寒與桂枝<small>加桂湯以泄奔豚之氣</small>火逆下之因燒針煩躁者桂</p>	<p>枝甘草龍骨牡蠣湯主之<small>先火為逆復以下除之衰氣因虛又加燒針衰虛而為火</small></p>	<p>熱所煩故生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪</p>	<p>桂枝甘草龍骨牡蠣湯方</p>	<p>桂枝 一兩 甘草 二兩 牡蠣 二兩 龍骨 二兩</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪</p>	<p>澀可去脫龍骨牡蠣之澀以收欲浮越之正氣</p>	<p>右為末以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服</p>	<p>太陽傷寒者加溫針必驚也<small>寒則傷榮榮氣微者加燒針則血留不行驚者溫針</small></p>	<p>損榮血而動心氣金匱要畧曰血氣少者屬於心</p>	<p>太陽病當惡寒發熱今自汗</p>	<p>出不惡寒發熱關上脉細數者以醫吐之過也一二日</p>	<p>吐之者腹中饑口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此為小逆<small>惡寒發熱為太</small></p>
------------------------------	---	---	--	--	------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	---	----------------------------	--------------------	------------------------------	---



<p>陽表病自汗出不惡寒發熱者陽明證本太陽表病醫反吐之傷動胃氣表邪乘虛傳於陽明也以關脈細數</p>	<p>知醫吐之所致病一二日為表邪尚寒而未成熱吐之則表寒傳於胃中胃中虛寒故腹中飢而口不能食病</p>	<p>三四日則表邪已傳成熱吐之則表熱乘虛入胃胃中虛熱故不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐也朝食暮吐者</p>	<p>晨食入胃胃虛不能消化即知至暮胃氣行衰與邪氣相搏則胃氣反逆而以胃氣尚在故止云小逆太陽</p>	<p>病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此為</p>	<p>吐之內煩也<small>太陽表病醫反吐之傷於胃氣邪熱乘虛入胃胃為邪熱內煩故不惡寒不欲近衣</small></p>	<p>也病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此以發汗</p>	<p>令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀以胃</p>	<p>欽定四庫全書<small>傷寒論注釋</small></p>	<p>中虛冷故吐也<small>陽受氣於胃中發汗外虛陽氣是令陽氣微膈氣虛也數為熱本熱則合消穀</small></p>	<p>客熱則不能消穀因發汗外損陽氣致胃中虛冷故吐也<small>太陽病過經十餘日心下</small></p>	<p>溫溫欲吐而胃中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此</p>	<p>時自極吐下者與調胃承氣湯若不爾者不可與但欲</p>	<p>嘔胃中痛微澹者此非柴胡證以嘔故知極吐下也<small>心下</small></p>	<p>溫溫欲吐鬱鬱微煩胃中痛當責邪熱客於胃中大便秘澹腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐</p>	<p>下止是傳邪亦未可下當與柴胡湯以除上占二焦之邪若曾吐下傷損胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非柴胡湯所能去與調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先曾傷動也<small>太陽病六七日表證仍</small></p>
---	---	---	--	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	--	---	---



<p>在脉微而沈反不結胃其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主之</p> <p><small>太陽經也膀胱府也此太陽隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時脉微而沈邪氣在裏之脉也表證仍在者則邪氣猶淺當結於胃中若不結於胃中其人發狂者熱結在膀胱也經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞭滿小便不利者為無血也小便自利者血證諦也與與抵當湯以下畜血</small></p>		<p>抵當湯方</p>		<p>水蛭 三十箇熬 味鹹苦寒 蟲蟲 三十箇熬去翅 足味苦微寒</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>傷寒論注釋</p>		<p>桃仁 二十箇去皮 尖味苦甘平 大黃 三兩酒浸 味苦寒</p>		<p><small>苦走血鹹勝血蟲蟲水蛭之鹹苦以除畜血甘緩結苦泄熱桃仁大黃之苦以下結熱</small></p>		<p>右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不</p>		<p>下再服</p>		<p>太陽病身黃脉沈結少腹鞭小便不利者為無血也小</p>		<p>便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之</p>		<p><small>身黃脉沈結少腹鞭小便不利者胃熱發黃也可與茵陳湯身黃脉沈結少腹鞭小便自利其人如狂者非胃中瘀熱為熱結下焦</small></p>		<p><small>而為畜血也與抵當湯以下畜血</small> 傷寒有熱少腹滿應小便不利今反</p>	
---	--	-------------	--	---	--	---------------	--	--------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	--	------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--



<p>利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸</p> <p><small>傷寒有熱少腹滿是</small></p> <p>畜血於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液而畜血不行小便自利者乃為畜血當與桃仁承氣湯抵當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂是未至於甚故不可餘腴峻之藥也可與抵當丸小可下也之</p>	<p>抵當丸方</p>	<p>水蛭 二十箇 <small>味苦寒</small> 蠪蟲 二十五箇 <small>味苦微寒</small> 桃仁 二十箇 <small>去皮尖</small></p>	<p>大黃 三兩</p>	<p>右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>晬時當下血若不下者更服</p>	<p>太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦</p>	<p>裏急也</p> <p><small>飲水多而小便自利者則水不內畜但腹中水多令心下悸金匱要畧曰食少飲多水停心下水畜於內而不行必苦裏急也</small></p>	<p>釋音</p>	<p>內諸藥</p> <p><small>納上音</small> 啜粥 <small>飲上音</small> 昌悅切</p> <p><small>疾智切</small> 蛭 <small>音回人腹</small> 莖 <small>音</small> 瞑 <small>音冥</small> 視 <small>悸心其悸切</small> 人 <small>音</small> 獲 <small>音</small> 漬</p>	<p>參</p> <p>啖咀 <small>上音</small> 咀 <small>音</small> 父下才與切 <small>咬</small> 更衣 <small>音</small> 更 <small>音</small> 沫 <small>音</small> 末 <small>音</small> 懊 <small>音</small> 懷 <small>音</small> 刀上切</p>
---	-------------	--	--------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------------	---	-----------	--	---



下奴刀切又女江切	心亂也摠懷痛悔聲	室	陟衆切	擗	牌入切	胸	音繇也	慄	音栗
懽	音積也	嘿	音靜也	但見	下音現	飴	音錫也	烝	音諸氣上行也
音	音滲切	諦	音審也	水蛭	音質	蟲	音盲	駛峻	上音決下險切



欽定四庫全書

子部

傷寒論注釋卷
五四

詳校官太醫院八品室日黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣汪志伊



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷四

金成無已注

辨太陽病脉證并治法下第七

問曰病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮

關脉沈名曰結胃也何謂藏結答曰如結胃狀飲食如

故時時下利寸脉浮關脉小細沈緊名曰藏結舌上白

胎滑者難治

結胃者邪結在胃藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入

欽定四庫全書

傷寒論注釋

裏與陽相結者為結胃以陽受氣於胃中故向與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故向氣宜通而寒故

病邪結陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是二者皆心下鞅痛寸脉浮關脉沈知邪結在陽

也寸脉浮關脉小細沈緊知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘腸虛而下故時

時自下利陰得陽則解藏結得熱證多則易治藏結無

舌上白胎滑邪氣著結胃中亦寒故云難治

陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

結藏於法當下無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如胎者以丹田有

熱胃中有寒邪氣以表裏皆寒故不可攻病發於陽而反下之熱入因作結

胃病發於陰而反下之因作痞所以成結胃者以下之



<p>大早故也<small>發熱惡寒者發於陽也而反下之則表陽</small> <small>陰也而反下之則表陰邪入裏結於心下為痞</small> 結胃者項亦強如柔瘕狀下 之則和宜大陷胃丸方 <small>結胃病項強者為邪結胃中胃能挽是項強亦如柔瘕之狀也與大陷胸丸下結泄滿</small></p>	<p>大陷胃丸方</p>	<p>大黃<small>半斤味苦寒</small> 葶藶<small>半斤熱味苦寒</small> 芒硝<small>半斤味鹹寒</small></p>	<p>杏仁<small>半升去皮尖熱黑味苦甘溫</small></p>	<p><small>大黃芒硝之苦鹹所以下熱葶藶杏仁之苦甘所以泄胃甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄滿實</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p><small>也物</small></p>	<p>右肆味搗篩貳味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸壹枚別搗甘遂末壹錢匕白蜜貳合水貳升煮取壹升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下為効</p> <p>禁如藥法</p>	<p>結胃證其脉浮大者不可下下之則死 <small>結胃為邪結胃中屬上焦之分得寸脉浮關脉沉者為在裏則可下若脉浮大心下難結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難可制故云</small> 結胃證悉具煩躁者亦死 <small>結胃證悉具邪結已深也煩躁者正下之則死</small></p>
---	---------------------	---	--	--	---	--------------------------	--	--



<p>氣散亂也邪氣 勝正病者必死 太陽病脉浮而動數浮則為風數則為</p>	<p>熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒</p>	<p>者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛</p>	<p>客氣動膈短氣躁煩心中懊懣陽氣內陷心下因鞭則</p>	<p>為結胃大陷胃湯主之若不結胃但頭汗出餘處無汗</p>	<p>劑頸而還小便不利身必發黃也<small>動數皆陽脉也常責</small></p>	<p>謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱</p>	<p>微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛</p>	<p>其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脉邪在裏則見</p>	<p>陰脉邪氣內陷動數之脉所以變遲而浮脉獨不變者</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>以邪結胃中上焦陽結脉不得而沈也客氣者外邪乘</p>	<p>胃中空虛入裏結於胃膈膈中拒痛者客氣動膈也金</p>	<p>匱要畧曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊懣</p>	<p>皆邪熱為實陽氣內陷氣不得逆於膈雍於心下為鞭</p>	<p>滿而痛成結胸也與大陷胃湯以下結熱若胃中空虛</p>	<p>陽氣內陷不結於胃膈下入於胃中者通身汗出則為</p>	<p>熱越不能發黃若但頭汗出身無汗刺頭 而還小便不利者熱不得越必發黃也</p>	<p>大陷胃湯方</p>	<p>大黃<small>陸兩去</small>芒硝<small>壹升</small>甘遂<small>壹錢匕</small></p>	<p>大黃謂之將宜以苦蕩滌芒硝一名消石以其鹹能</p>	<p>更鞭夫間有遂以通水也甘遂若夫間之遂其氣能</p>	<p>可以直達透結 胃陷三物為允</p>
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------



右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒硝煮
壹兩沸內甘遂末溫服壹升得快利止後服

傷寒六七日結胸熱實脉沈而緊心下痛按之石鞭者

大陷胸湯主之

病在表而下之熱入因作結胸此不云下後而云傷寒六七日則是傳裏之實

熱也沈為在裏緊為裏實以心下痛按之實鞭是以為結胸與大陷胸湯以下結熱傷寒十餘日

熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱

者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱為正邪分爭未全欲結與大柴胡湯下之但結胸無大熱者

欽定四庫全書

傷寒論注釋

非熱結也是水飲結於胸脇謂之水結胸問身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘處無汗是水飲不

得外泄停畜而不行也太陽病重發汗而復下之不大

便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

重發汗而復下之則內外重亡

津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日晡潮熱者屬胃此日晡小有潮熱非但在胃從心下至

少腹鞭滿而痛不可近者是一腹之中上下邪氣俱其也與大陷胸湯以下其邪小結胸病正

在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

心下鞭痛手不可近

者結胸也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胸結胸脉沈緊或寸浮關沈今脉浮滑知熱未深結與



小陷胃湯以除
胃腸上結熱也

小陷胃湯方

黃連壹兩 苦寒 半夏半升 辛溫 枳實大者壹箇 苦寒

苦以泄之辛以收之黃連枳實
之苦寒以泄熱半夏之辛以散結

右參味以水陸升先煮枳實取參升去滓內諸藥煮

取貳升去滓分溫參服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此

本有寒分也反下之若利止必作結胃未止者四日復

欽定四庫全書

傷寒論注釋

下之此作協熱利也

太陽病二三日邪在表也不能卧但欲起心下必結者以心下結滿有水分

有寒分而愈蓋故不能卧但欲起也心下結滿有水分

反下之則太陽表邪乘虛入裏利止則邪氣留結為結

胃利不止至次日復如前下利不止者是邪熱下攻腸

胃為袂熱利也太陽病下之其脉促不結胃者此為欲解也脉

浮者必結胃也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急脉

細數者頭痛未止脉沈緊者必欲嘔脉沈滑者協熱利

脉浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變其脉促者為陽盛下後脉浮為二焦陽邪結而為結胃



傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於少陰之絡令人嘔痛不可內食所以脉緊者必咽痛脉弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽受病也其脉循脇絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下復邪氣傳裏則頭痛當止脉細數為邪未傳裏而傷氣也細為氣少數為在表故頭痛未止脉沈緊則太陽之邪傳於陽明為裏實也沈為在裏緊為裏實陽明裏實故必欲嘔脉滑則太陽之邪傳於腸胃以滑為陰氣有餘知邪氣入裏千於下焦也沈為血勝氣虛是為協熱利浮為氣勝血虛是知必下血經日不宜下而便攻之謹變不可購數此之謂也

病在陽應以汗解之反以冷水漬之若灌之其

欽定四庫全書

傷寒論注釋

與三物小陷胷湯白散亦可服

病在陽為邪在表也法當汗出而解反以冷水

漢之灌洗熱被寒水外不得出則反攻其裏顧更益煩
 肉上衆起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水者裏有
 熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水寒之
 氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗以和
 之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結於胃
 膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結胃無
 熱證者外無熱而熱悉收飲於裏也與小
 陷胃湯以下逐之白散下熱故亦可攻

文蛤散方

文蛤

鹹 五
寒 兩
味

以鹹走腎則可

右壹味為散以沸湯和壹升溫服湯用五合

白散方

桔梗

參分味辛
苦微溫

芭豆

壹分去皮心熬
黑研如脂辛溫

貝母

三分味
辛苦平

辛散而苦泄桔梗貝母之苦平
用以下氣芭豆之辛用以散實

右件參味為散內芭豆更於白中杵之以白飲和服

強人半錢七藏者減之病在膈上必吐在膈下必利

不利進熱粥壹杯利過不止進冷粥壹杯身熱皮粟

不解欲引衣自覆者若水以濯之洗之益令熱劫不

欽定四庫全書

傷寒論注釋

得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥

參兩如上法

太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞

鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則

譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門

太陽之脉絡頭
下項頭項強痛

者太陽表病也少陽之脉循脅絡脇如結胃心下痞
者少陽裏病也太陽少陽相併為病不純在表故頭項

不但強痛而或按胃亦未全入裏故時如結胃心下痞
鞭此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以寫

太陽之邪刺肝俞以寫少陽之邪邪在表則可發汗邪
在半表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動胃氣少



陽之邪因干於胃土為太刑必發譫語脉弦至五六日
傳經急邪熱去而譫語當止若後不止為少陽邪熱甚
也刺期門以氣婦人中風發熱惡寒經水適來得之七入
寫肝膽之氣
日熱除而脉遲身涼胃脇下滿如結胃狀譫語者此為
熱入血室也當刺期門隨其實而寫之
中風發熱惡寒
表病也若經水
不來表邪傳裏則入府而不入血室也因經水適來血
室空虛至七八日邪氣傳裏之時更不入府乘虛而入
於血室熱除脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胃脇
下滿如結胃狀譫語者熱入血室而裏實期門者肝之
募肝主血刺期門者寫血室之熱
審看何經氣實更隨其實而寫之婦人中風七八日續
得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必
結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之
中風七八日
邪氣傳裏之
時本無寒熱而續得寒熱經水適斷者此為表邪乘血
室虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也
血氣與邪分爭致寒熱如瘧而發作
有時與小柴胡湯以解傳經之邪
婦人傷寒發熱經
水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血
室無犯胃氣及上二焦必自愈
傷寒發熱者寒已成熱
也經水道來則血室空
虛邪熱乘虛入於血室若晝日譫語為邪客於府與陽
爭也此晝日明了暮則譫語如見鬼狀是邪不入府入
於血室與陰爭也陽盛譫語則宜下此熱入血室不可
與下藥犯其胃氣熱入血室血結寒熱者與小柴胡湯
散邪發汗此雖熱入血室而不留結不可與發汗藥犯
其上焦熱入血室胃脇滿如結胃狀者可就期門此雖

欽定四庫全書

傷寒論注釋



<p>甘草 味甘平</p>	<p>括蕒根 苦寒</p>	<p>柴胡 苦平</p>	<p>桂枝 辛熱</p>	<p>乾薑 辛熱</p>	<p>牡蠣 鹹寒</p>	<p>柴胡桂枝乾薑湯方</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>	<p>傷寒五六日已發汗而復下之</p>
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解傳
裏之邪邪甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散在表
之邪鹹以與之牡蠣之鹹以消堅脇之滿辛以潤之
乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為渴苦以堅
之括蕤之苦
以生津液

右柴味以水壺斗貳升煮取陸升去滓再煎取參升

溫服壺升日參服初服微煩復服汗出便愈

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食

大便鞭脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沈亦

在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入

欽定四庫全書

傷寒論注釋

在裏此為半在裏半在外也脈雖沈緊不得為少陰病

所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與

小柴胡湯設不了了者得屎而解

傷寒五六日邪當傳裏之時頭汗出微惡

寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞭脈細者邪結於裏也大便鞭為陽結此邪熱雖傳於裏然

以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微結脈沈雖為在裏若純陰結則更無頭汗惡寒之表證諸陰脈皆至頭暫

中而還不上循頭今頭汗出知非少陰也與小柴胡湯以除半表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者為裏

熱未除與湯取其微利則愈故云得屎而解

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡

湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此



雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心
 下滿而鞭痛者此為結胃也大陷胃湯主之但滿而不
 痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯傷寒五六
日邪在表
 表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證是為柴胡
 證具以他藥下之柴胡證不能者不為逆如與柴胡湯
 則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則陰陽俱有
 邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下後陽邪傳
 裏者則結於胃中為結胃以胃中為陽受氣之分與大
 陷胃湯以下其結陰邪傳裏者則留於心下為痞以心
 下為陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發
 於陽而反下之熱入因作結胃病發於陰而反下之因
 作痞此
 之謂也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

半夏瀉心湯方

半夏

半升洗
味辛平

黃芩

味苦
寒

乾薑

味辛
熱

人參

已上各三
兩味甘溫

黃連

一兩味
苦寒

甘草

二兩氣
味甘平

大棗

十二枚擘
味甘溫

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而泄熱
 黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人
 參甘草大棗
 之甘以緩之

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升溫服

壹升日叁服



太陽少陽併病而反下之成結胃心下鞭下利不止水	漿不下其人心煩	<small>太陽少陽併病為邪氣在半表半裏也而反下之二經之邪乘虛而入太陽表邪入裏結於胃中為結胃心下鞭少陽裏邪乘虛</small>	<small>下于腸胃遠利不止若邪結陰分則飲食如故而為藏</small>	<small>結此為陽邪內結故</small>	水漿不下而心煩	脉浮而緊而復下之緊反入裏則	作痞按之自濡但氣痞耳	<small>浮而緊浮為傷陽緊為傷陰當發其汗而反下之若浮入裏為陽邪入裏則作痞</small>	<small>而緊入裏者為陰邪入裏則作痞</small>	太陽中風下利嘔	逆表解者乃可攻之其人絳絳汗出發作有時頭痛心	下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解	欽定四庫全書	傷寒論注釋	裏未和也十棗湯主之	<small>下利嘔逆裏受邪也邪在裏者不可下亦須待表解者乃可攻之其人絳絳汗出發作有時不惡寒者表已解也頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣者邪熱內畜而有伏飲是裏未和也與十棗湯下熱逐飲</small>	十棗湯方	芫花	大棗	<small>辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大戟之</small>	<small>苦以泄之水者腎所主也甘者脾之味也大棗之甘而勝水</small>
-----------------------	---------	--	--------------------------------------	-------------------------	---------	---------------	------------	--	------------------------------	---------	-----------------------	-----------------------	--------	-------	-----------	---	------	----	----	-------------------------------------	--



<p>右上參味等分各別搗為散以水壹升半先煮大棗 肥者拾枚取捌合去滓內藥末強人服壹錢七贏人 服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服 加半錢得快下利後糜粥自養</p>	<p>太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱 虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胃煩面色青 黃膚暍者難治今色微黃手足溫者易愈 <small>太陽病因發汗遂發熱惡寒者外虛陽氣邪復不除也因復下之又虛其裏表虛虛邪內陷傳於心下為痞發汗表虛為竭陽下之裏虛</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>為竭陰表證罷為無陽裏有痞為陰獨又加燒針虛不 勝火火氣內攻致胃煩也傷寒之病以陽為主其人面 色青膚肉暍動者陽氣大虛故云難治若面 色微黃手足溫者即陽氣得復故云易愈 心下痞按</p>	<p>之濡其脉關上浮者大黃黃連瀉心湯主之 <small>心下痞按沈者實熱也心下痞按之濡其脉關上浮者虛熱也大黃黃連瀉心湯以導其虛熱</small></p>	<p>大黃黃連瀉心湯方 大黃 貳兩 味 黃連 壹兩 味 <small>內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻湯瀉服者取其氣薄而泄虛熱</small></p>	<p>而泄虛熱</p>
---	--	---	--	---	--	-------------



右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾絞去滓分溫再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

心下痞者虛熱內伏

也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽

本以下之故心下痞與

瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散

主之

本因下後成痞常與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而口燥煩小便不利者為水飲內畜津液

不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍之一日乃愈者不欲者外水不入所停之水得行而痞亦愈

矣

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脅

下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之

胃為津液之主

欽定四庫全書

傷寒論注釋

陽氣之根大汗出後外亡津液胃中空虛客氣上逆心下痞鞭金匱要略曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭者胃虛而不殺穀也脅下有水氣腹中雷鳴

土弱不能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以益胃傷

寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷

鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病

不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上

逆故使鞭也甘草瀉心湯主之

傷寒中風是傷寒或中風也邪氣在表醫反下

之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安

者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻表加甘草以補虛前以汗後胃虛是外傷陽氣故加生薑此以下後



<p>胃虛是內損陰 氣故加甘草 傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉</p>	<p>心湯已復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚</p>	<p>理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復</p>	<p>利不止者當利其小便 <small>傷寒服湯藥下後利不止而心下痞鞭者氣虛內客氣上逆也</small></p>	<p>與瀉心湯攻之則痞已 <small>下痞鞭者氣虛內客氣上逆也</small></p>	<p>利不止也理中丸脾胃虛寒下利者服之愈此以下焦</p>	<p>虛故與之其利益其聖濟經曰滑則氣脫欲其收也如</p>	<p>與赤石脂禹餘糧湯以瀉利所以收之此利由下焦不約</p>	<p>水故不分也若服瀉利而利不止當利小便以分其氣</p>	<p>赤石脂禹餘糧湯方</p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>赤石脂 <small>壹斤碎 味甘溫</small> 禹餘糧 <small>壹斤碎 味甘平</small></p>	<p>已上貳味以水陸升煮取貳升去滓參服</p>	<p>傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下</p>	<p>痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕者以而成瘕 <small>傷寒吐下後發汗則</small></p>	<p>表裏之氣俱虛虛煩脈甚微為正氣內虛邪氣獨在至</p>	<p>七八日正氣當復邪氣當罷而心下痞脇下痛氣上衝</p>	<p>寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋復代</p>
---	------------------------------	------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	-------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>赭石湯主之 <small>大邪難解以胃發汗吐下胃氣弱而未和 虛氣上逆故心下痞噎噎氣不除與旋復 代赭石湯降 虛氣而和胃</small></p>	<p>旋復代赭石湯方</p>	<p>旋復花 <small>參兩味 鹹溫</small></p>	<p>代赭石 <small>壹兩味 苦寒</small></p>	<p>半夏 <small>半升洗 味辛溫</small></p>	<p>右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煎取參升溫服</p>	<p>壹升日三服</p>	<p>下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻</p>	<p>黃杏子甘草石膏湯 <small>前第三卷廿六證云發汗後不可 更行桂枝湯汗出而喘無大熱者</small></p>	<p>為與此證治法同汗下雖殊說不當撰正氣則一邪氣 <small>所傳既同遂月一法治之經所謂若發汗若下若吐後</small></p>	<p>者足 <small>矣</small></p>	<p>太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不</p>	<p>止心下痞鞅表裏不解者桂枝人參湯主之 <small>外證未除 而數下之</small></p>	<p>為重虛其裏邪熱乘虛而入裏虛滿熱遂利不止內心 <small>下痞若表解而下利心下痞者可與瀉心湯若不下利</small></p>			
---	----------------	--	--	--	-----------------------------	--------------	------------------------------	--	--	---------------------------------	----------------------------	---	--	--	--	--

欽定四庫全書

傷寒論注釋



表不解而心下痞者可先解表而後攻痞
以表裏不解故與桂枝人參湯和裏解表

桂枝人參湯方

桂枝

四兩 辛 熱

甘草

四兩 甘 平

白朮

參 兩 味

人參

甘 溫 味

乾薑

辛 熱 味

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之此以裏
氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯也

右伍味以水玖升先煮四味取伍升內桂更煮取參

升溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

欽定四庫全書

傷寒論注釋

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大

黃黃連瀉心湯

大下後復發汗則表裏之邪皆悉已此
心下痞而惡寒者表裏之邪俱不解也

因表不解而下之為心下痞先與桂枝湯解表表解乃
與大黃黃連瀉心湯攻痞內經曰從外之內而盛於內

者先治其外
而後調其內傷寒發熱汗出不解心下痞嘔吐而下

利者大柴胡湯主之

傷寒發熱已成熱也汗出不解
表和而裏病也吐利心腹滿裏為

裏虛嘔吐而下利心下痞者
裏實也與大柴胡湯以下裏熱
病如桂枝證頭不痛

項不強寸脉微浮胃中痞鞭氣上衝咽喉不得息者此

為胃有寒也當吐之宜瓜蒂散

病如桂枝證為發熱汗
出惡風言邪在表也頭



痛項強為桂枝湯證。其若頭不痛，項不強，則邪不在表。而傳裏也。浮為在表，沈為在裏。今寸脈微浮，則邪不在中者，猶如桂枝證而寸脈微浮也。以胃中痞硬，故知邪在胃。咽嗑不得息，知邪客於胃中。而不在表也。千金曰：氣浮上部，填塞胃心，胃中滿者，吐之則愈。與瓜蒂散以吐之邪。

瓜蒂散方

瓜蒂

壹分 熬黃
味苦寒

赤小豆

壹分 味酸溫

其高者越之，越以瓜蒂香豉之苦在上者，湧之湧以赤小豆之酸內經曰酸苦湧泄為陰

右貳味各別搗篩為散，已合治之，取壹錢匕以香豉

欽定四庫全書

傷寒論注釋

壹合用熱湯柒合煮作稀糜，去滓取汁和散溫頓服之。不吐者少少加得快吐乃止。諸亡血虛家不可與。

瓜蒂散

病脇下素有痞，連在臍傍，痛引少腹，入陰筋者，此名藏

結死

素有宿昔之積，結於脇下為痞。今因傷寒邪氣入裏，與宿積相合，使藏真之氣結而不通，致連在臍

傍，痛引少腹。傷寒病若吐若下後七八日不解，熱結在

裏，表裏俱熱，時時惡風，大渴舌上乾燥而煩，欲飲水數

升者，白虎加人參湯主之。

若吐若下後七八日則當解，復不解而熱結在裏，表熱者



<p>身熱也裏熱者內熱也本因吐下後邪氣乘虛內陷為結熱若無裏熱而純為裏熱則邪熱結而為實此以表熱未罷時時惡風若邪氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡風以時時惡風知表裏俱有熱也邪熱結而為實者則無大渴邪熱散漫則渴今雖熱結在裏表裏俱熱未為結實邪氣散漫意惡焦膈故大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升與傷寒無大熱口燥渴心煩白虎加人參湯散熱生津</p>	<p>背微惡寒者白虎加人參湯主之無大熱者為身無大熱也口燥渴心煩者常作陽明病然以背微惡寒為表未全罷所以屬太陽也背為陽背惡寒口中和者少陰病也常與附子湯今口燥而渴背雖惡寒此裏熱也則惡寒亦不至其故云微惡寒與白虎湯和表散熱加人參止渴生津傷寒</p>	<p>寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>水無表證者白虎加人參湯主之傷寒脉浮發熱無汗其表不解不渴者宜麻黃湯渴者宜五苓散非白虎所宜大渴欲水無表證者乃可與白虎加人參湯以散裏熱臨病之工大宜精別</p>	<p>太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者當刺大椎肺</p>	<p>俞肝俞慎勿下之</p>	<p>以太陽脉下項俠脊故兩肝俞以寫少陽之邪以懸為肝之府故兩太陽為在表少陽為在裏即是半表半裏證前第八證云不可發汗發汗則譫語是發汗攻太陽之邪少陽之邪並其干胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽之邪太陽之邪參虛入裏必作結胸</p>	<p>合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯</p>
--	---	------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	----------------	---	------------------------------



<p>主之 太陽陽明合病自下利為在表常與葛根湯發汗 此太陽少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之 故與黃芩湯以和解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故 加半夏生薑以散逆氣</p>	<p>黃芩湯方</p>	<p>黃芩 參雨味 甘草 貳雨炙 芍藥 貳雨味</p>	<p>大棗 拾貳枚擘 味甘溫</p>	<p>虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸 以堅飲陽胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗 之甘以補固 腸胃之弱</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>右肆味以水壹斗煮取參升去滓溫服壹升日再夜 壹服若嘔者加半夏半升生薑參兩</p>	<p>傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯 主之 濕家下後舌上如胎者以升田有熱胃上有寒是 邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而 為下寒上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而 獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為 中熱欲嘔吐與黃連湯升陰陽之氣</p>	<p>黃連湯方</p>	<p>黃連 寒味苦 甘草 甘平炙 乾薑 熱味辛</p>
---	-------------	---	-------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	-------------	---



<p>桂枝 去皮味辛 熟各參兩人 甘溫 半夏 半升洗</p>	<p>大棗 拾貳枚擘 味甘溫</p>	<p>上熱者泄之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂枝半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃</p>	<p>右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁服</p>	<p>夜貳服</p>	<p>傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之 傷寒與中風家至七八日再經之時</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數多後身體疼痛煩不能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能自轉側者濕也經曰風則浮虛脉經曰脉來濇者為病寒濕也不嘔不渴裏無邪也脉得浮虛而濇身有疼痛煩知風濕但在經也與桂枝附子湯以散表風濕 若其人大便鞭小便自利者去</p>	<p>桂枝加白朮湯主之 桂發汗走津液此小便利大便鞭為津液不足去桂加朮</p>	<p>桂枝附子湯方</p>	<p>桂枝 四兩去皮 味辛熱 附子 參枚炮去皮破 八片味辛熱 生薑 參兩切 味辛溫</p>	<p>甘草 貳兩炙 味甘溫 大棗 拾貳枚擘 味甘溫</p>	<p>風在表者散以桂枝甘草之辛甘濕在經者逐以附子之辛熱蒼朮辛甘行榮衛通津液以和表也</p>
--	------------------------	---	-----------------------------	------------	--	---------------------	--	--	---------------	---	---------------------------------------	---



右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫參服

風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出

短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子

湯主之風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂經故骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則

衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為濕外搏也與甘草附子湯散濕

固衛氣

甘草附子湯方

甘草

貳兩炙味甘平

附子

貳枚炮去皮破味辛熱

白朮

貳兩味甘溫

欽定四庫全書

傷寒論注釋

桂枝

貳兩炙味辛熱

桂枝甘草之辛甘散風邪而和衛附子白朮之辛甘解濕氣而溫經

右肆味以水陸升煮取參升去滓溫服壹升日參服

初服得微汗則解能食汗止復煩者服五合恐壹升

多者宜服六七合為始

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之

浮為在表滑為在裏

表有熱外有熱也裏有寒有邪氣傳裏也以邪未入府故止言寒如瓜蒂散證云胃上有寒者是矣與白虎湯

以解內外之邪



<p>白虎湯方</p>		<p>知母 陰兩味 苦寒</p>	<p>石膏 壹斤碎 味甘寒</p>	<p>甘草 貳兩味 甘平</p>	<p>粳米 陰合味 甘平</p>	<p>內經曰熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之甘以 微熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣</p>	<p>右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓溫服壹升日叁</p>	<p>服</p>	<p>傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之 結代之脈動而中 結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中 悸動知真氣內虛也與炙甘草湯益虛補血氣而復脉</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>炙甘草湯方</p>	<p>甘草 肆兩炙 味甘平</p>	<p>生薑 叁兩切 味辛溫</p>	<p>桂枝 叁兩去皮 味辛熱</p>	<p>人參 貳兩味 甘溫</p>	<p>生地黃 壹斤味 甘寒</p>	<p>阿膠 貳兩味 甘溫</p>	<p>麥門冬 半升去心 味甘平</p>	<p>麻子仁 半升味 甘平</p>	<p>大棗 叁十枚 味甘溫</p>	<p>補可以去弱人參甘草大棗之甘以補不足之氣桂 枝生薑之辛以益氣聖濟經曰津耗散為枯五臟 痿弱榮衛潤流滋劑所以潤之麻仁阿膠 麥門冬地黃之甘潤經血後脉通心也</p>	<p>右玖味以清酒柒升水捌升先煮捌味取叁升去滓</p>	<p>內膠烱消盡溫服壹升日叁服一名復脉湯</p>
-------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------	----------	---	-------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------------	--------------------------



<p>脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治</p> <p>結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉來動而中止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結者生代者死此也</p>	<p>釋音</p>	<p>俛 音免 如倫切 目動也 匱 求位切 痿 於危切 柔 音軟 椎 音掣</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>昌列切 涸 乎各切 燂 音羊</p>	<p>傷寒論注釋卷四</p>
---	-----------	---	---------------	---------------------------	----------------



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷五

金成無已注

辨陽明病脉證并治法第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也

陽明胃也邪自太陽經傳之入府者謂之太陽陽明

經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便秘因鞭者與小承氣湯即是太陽陽明脾約病也正陽

陽明者胃家實是也

邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明病脉遲雖汗出不

欽定四庫全書

傷寒論注釋

惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之即是正陽陽

明胃家實也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩

實大便難是也

邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經曰傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少

陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃即少陽陽明病也

陽明之為病胃家實也

邪傳入胃熱毒留結則胃家為實華佗曰熱毒入胃要須下去之不可留於胃中是知邪在陽明為胃家實也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發汗若下若利小便

此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難

者此名陽明也

本太陽病不解因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人



登願必更衣不更衣者通為不大便不更衣則胃中物
不得泄故為內實胃無津液加之富熱大便則難為陽
明裏也問曰陽明病外證云何荅曰身熱汗自出不惡寒
反惡熱也陽明病為邪入府也邪在表則身熱汗出而
惡熱也問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也
荅曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也邪
在陽明常發熱而不惡寒今得之一日猶不發熱而惡
寒者即邪未全入府尚帶表邪若表邪全入則更無惡
寒必自汗出問曰惡寒何故自罷荅曰陽明居中土也
萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病
欽定四庫全書 傷寒論注釋
也胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入於胃
入胃則更不復傳如太陽病傳之入胃則更不傳陽
明陽明病傳之入胃則更不傳少陽本太陽初得病時
少陽病傳之入胃則更不傳三陰
發其汗汗先出不微因轉屬陽明也傷寒傳經者則一
此太陽傳經放傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出
曰轉屬陽明傷寒發熱無汗嘔不能食者太
澱然者是轉屬陽明也陽受病也若反汗出澱然者太
太陽之邪轉屬陽明內傷寒三日陽明脉大傷寒三日
經曰陽明病法多汗傷寒三日陽明脉大邪傳陽明
之時經曰尺寸俱長者陽明受病當二三日傷寒脉浮
發陽明氣血俱多又邪併於經是以脉大傷寒脉浮
而緩手足自溫者是為繫在太陰太陰者身當發黃若



小便自利者不能發黃至七八日大便鞭者為陽明病

也浮為陽邪緩為脾脉傷寒脉浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪在三陰則手足寒今手足自溫是知

繫在太陰也太陰上為邪乘之則色見於外當發身

黃小便自利者熱不內畜不能發黃至七八日大便鞭

者即太陰之邪入府轉屬陽明也傷寒轉繫陽明者其人濇然微汗出

也傷寒則無汗陽明法多汗此以傷陽明中風口苦咽

乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮而緊若下之則腹滿小便

難也脉浮在表緊為裏實陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於裏也發熱惡寒者表仍未解也若下

之裏邪雖云表邪復入於裏又亡津液故使腹滿而小便難陽明病若能食名中風

欽定四庫全書傷寒論注釋
不能食名中寒陽明病以飲食別受風寒者以胃為水

能食寒為陰邪陰邪不殺之海風為陽邪陽邪殺殺故中風者

殺殺故傷寒者不能食陽明病若中寒不能食小便不

利手足濇然汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以

然者以胃中冷水穀不別故也陽明中寒不能食者寒

淫液不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足濇然

汗出而身無汗者陽明中寒也固瘕者寒氣結積也胃

中寒甚欲留結而為固瘕則淫液不得通行而大便必

鞭者若汗出小便不利者為實也此以小便不利水穀

不別雖大便初陽明病欲食小便反不利大便自調其

人骨節疼翁翁如有熱狀奄然發汗濇然汗出而解者



此水不勝穀氣與汗共併脉緊則愈

陽病客熱初傳入胃胃熱則消穀而

欲食陽明病熱為實者則小便當數大便當鞏今小便

反不利大便自調者熱氣散漫不為實也欲食則胃中

澀多內經曰食入於陰長氣於陽氣多則陽氣勝熱消

津液則水少經曰水入於經其血乃成水少則陰血弱

金匱要畧曰陰氣不通即骨疼其人骨節疼者陰氣不

足也熱其於表者翕翕發熱其於裏者蒸蒸發熱此

熱氣散漫不專著於表裏故翕翕如有熱狀奄忽也忽

然發狂者陰不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則脉流

薄疾并乃狂陽明蘊熱為實者須下之愈熱氣散漫不

為實者必待汗出而愈故云澀然汗出而解也水澀之

等者陰陽氣平也水不勝氣是陰不勝陽也汗出則

陽氣衰脉緊則陰氣生陰陽氣平兩無偏勝則愈故云

與汗共并陽明病欲解時從申至戌上以胃為陽土王

脉緊則愈陽明病欲解時從申至戌上於酉酉戌向王

欽定四庫全書傷寒論注釋

時是為陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛

冷故也以其人本虛故攻其熱必噦不能食胃中本寒

虛寒相搏故令噦也經曰開脉弱胃氣虛陽明病脉遲

有熱不可大攻之熱去則寒起此之謂也陽明病脉遲

食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下

之腹滿如故所以然者脉遲故也陽明病脉遲則邪方

入於陰長氣於陽胃中有熱食難用飽飽則微煩而頭

眩者氣與熱氣相搏也兩熱相合消持津液必小便

難利者不能發黃言熱得泄也小便不利則熱不得泄

身必發黃疸黃也以其發於穀氣之熱故名穀疸熱實

者下之則愈脉遲為熱氣未實雖下之陽明病法多汗

腹滿亦不減也經曰脉遲尚未可攻陽明病法多汗



<p>反無汗其身如蟲行皮中狀者以此久虛故也</p> <p><small>胃為津液之本</small></p>	<p>氣虛津液少病則反無汗胃候身之肌</p> <p><small>肉其身如蟲行皮中者知胃氣久虛也</small></p>	<p>而小便利二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬</p>	<p>不嘔手足不厥者頭不痛</p> <p><small>陽明傷寒而</small></p>	<p>寒氣內攻也至二三日</p> <p><small>者寒邪發於外也</small></p>	<p>必苦頭痛若不欬不嘔手足不厥者是寒邪但攻裏而</p>	<p>亦不痛也</p> <p><small>陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬其人</small></p>	<p>必咽痛若不欬者咽不痛</p> <p><small>陽明病身不重痛但頭眩而</small></p>	<p>內攻也經曰陽明病若能食名中風風邪攻胃胃氣上</p> <p><small>逆則咳喘胃之系欬其則咽傷故必咽痛若胃氣</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p><small>傷寒論注釋</small></p>	<p>不逆則不欬其</p> <p><small>咽亦不痛也</small></p>	<p>陽明病無汗小便不利心中懊惱者身</p>	<p>必發黃</p> <p><small>陽明病無汗而小便不利者熱發於內而不得</small></p>	<p>陽明病被火額上微汗出小便不利者必發黃</p> <p><small>陽明病</small></p>	<p>熱被火則火熱相合而甚若過身汗出而小便利者熱得</p> <p><small>外越不能發黃今額上微汗出而小便不利則熱不得</small></p>	<p>越發黃也</p> <p><small>陽明病脈浮而緊者必潮熱發作有時但</small></p>	<p>浮者必盜汗出</p> <p><small>浮為在經緊者裏實脈浮而緊者裏熱</small></p>	<p>不緊者止是表熱也必盜汗出盜汗者睡而</p> <p><small>汗出也陽明病裏熱者自汗表熱者盜汗</small></p>	<p>燥但欲漱水不欲嚥者此必衄</p> <p><small>陽明之脈起於鼻終於</small></p>
--	--	------------------------------	---	--	------------------------------	--	---	--	---	---	------------------------	---	---	---	--	---	---	---



水此口燥但欲飲水不欲飲者是熱在經而裏無熱也陽明氣血俱多經中熱其迫血妄行必作衄也陽明

病本自汗出醫更重發汗病已差尚微煩不了了者此

大便必鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問

其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大

便不久出今為小便數少以津液當還入胃中故知不

久必大便也

先亡津液使大便鞭小便數少津液分別大便必自下也

傷寒嘔多雖

有陽明證不可攻之

嘔者熱在上焦未全入府故不可下

陽明病心下鞭

滿者不可攻之攻之利遂不止者死利止者愈

陽明病腹滿者

欽定四庫全書

傷寒論注釋

為邪氣入府可下之心下鞭滿則邪氣尚淺未全入府不可使下之得利止者為邪氣去正氣安正氣安則愈

若因下利不止者

陽明病面合赤色不可攻之攻之必

發熱色黃小便不利也

合通也陽明病面色通赤者熱在經也不可下之下之虛其胃

氣耗其津液經中之熱乘虛入

胃必發熱色黃小便不利也陽明病不吐不下心煩

者可與調胃承氣湯

吐後心煩謂之內煩下後心煩謂之虛煩今陽明病不吐不下心煩

即是胃有鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者

其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏

也手足濇然而汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之



<p>若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下也陽明病脈遲遲若汗出多微發熱惡寒者表未解也若脈遲雖汗出而不惡寒者表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足為熱蒸之則周身汗出津液不足為熱蒸之其手足濇然而汗出知大便秘也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不潮是熱未成實故不可便與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣</p>									
<p>大承氣湯方</p>									
<p>大黃<small>四兩苦寒酒洗</small> 厚朴<small>半斤苦溫炙去皮</small> 枳實<small>五枚苦寒炙</small></p>									
<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>									
<p>芒硝<small>三合鹹寒</small></p>									
<p>內經曰濕淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以濕濕除熱又曰濕淫於內治以苦溫厚朴之苦下結燥又曰熱淫所勝治以鹹寒芒硝之鹹以攻蘊熱</p>									
<p>右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服</p>									
<p>小承氣湯方</p>									
<p>大黃<small>四兩</small> 厚朴<small>二兩炙去皮</small> 枳實<small>三枚大者炙</small></p>									



大熱結實者與大承氣湯小熱微結者與小承氣湯
以熱不大甚故於大承氣湯去芒硝又以結不至堅
故不減厚
朴枳實也

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初

服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與

之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣

湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可攻之若不轉失

氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必脹滿不能

食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞭而

少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也

得大便微鞭者便可攻之若不鞭者則熱未成實雖有

潮熱亦未可攻若不大便六七日恐有燥屎當先與小

承氣湯漬之如有燥屎小承氣湯藥勢緩不能宣泄必

轉氣下失若不轉失氣是胃中無燥屎但腸間少鞭爾

止初頭鞭後必澹攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食

也胃中乾燥則欲飲水水入胃中虛寒相搏氣逆則噦其

後却發熱者則熱氣乘虛還聚於胃中胃燥得熱必
大便復鞭而少與小承氣湯微利與和之故以重云不
轉失氣不可攻
內懷之至也
夫實則譏語虛則鄭聲鄭聲重語也
經內
曰邪氣盛則實精氣奪則虛譏語由邪氣盛而神識昏
也鄭聲由精氣奪而聲不全也譏語者言語不次也鄭

欽定四庫全書

傷寒論注釋



<p>聲者鄭音不正也論語云惡鄭聲之亂雅樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正也今新差氣虛人</p>	<p>聲轉者是所謂重語者也若聲重亦聲轉之直視讞語喘滿者死下利者亦</p>	<p>死直視讞語邪勝也喘滿為氣上發汗多若重發汗者</p>	<p>亡其陽讞語脉短者死脉自和者不死亡陽胃燥讞語</p>	<p>絕不可復治脉自和為正氣未衰而猶可生也傷寒若吐若下後不解不大便</p>	<p>五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見</p>	<p>鬼狀若劇者則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視</p>	<p>脉弦者生濇者死微者但發熱讞語者大承氣湯主之</p>	<p>欽定四庫全書傷寒論注釋</p>	<p>若一服利止後服若吐若下皆傷胃氣不大便五六日</p>	<p>內結也陽明三於內而十日者亡津液胃氣虛邪熱</p>	<p>甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實</p>	<p>也以為然氣有餘若劇者足然氣甚大也熱大蓋於內</p>	<p>昏冒正氣使不識人至於循衣摸牀惕而不安微喘直</p>	<p>視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱劇者為</p>	<p>陽勝脉弦為陰有餘濇為陰不足陽熱難劇脉弦知陰</p>	<p>未絕而續可生脉濇則陰絕故不可治其邪熱微而未 至於劇者但發熱讞語可與大承氣湯以下胃中熱經 曰凡服下藥中病即止不必盡劑此 以熱未劇故云若一服利則止後服陽明病其人多 汗以津液外出胃中燥大便必鞕鞕則讞語小承湯主 之若一服讞語止更莫復服亡津液胃燥大便鞕而讞 語難無大熱內結亦須與</p>
--	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



小承氣湯和其胃氣得一服譫語止則胃燥
以潤更莫復與承氣湯以本無實熱故也 陽明病譫

語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一

升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之明

日不大便脉反微澀者裏虛也為難治不可更與承氣

湯也 陽明病譫語發潮熱脉沈實者內實者也則可

下若脉滑疾為裏熱未實則不可下先與小承氣

湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣

湯一升以除之若不轉失氣者是無燥屎不可更與承

氣湯至明日邪氣傳時脉得沈實緊牢之類是裏實也

反得微澀者裏氣大虛也若大便利後脉微澀者止為

裏虛而猶可此不曾大便秘反微澀 陽明病譫語有潮

是正氣內衰為邪所勝故云難治 陽明病譫語有潮

熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但

鞭爾宜大氣湯下之 譫語潮熱為胃熱消穀引食反

也若能食者胃中虛熱雖鞭不得為有燥屎雖病虛為

不欲食實為欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛

熱其者能食與雖病為異也 陽明病下血譫語者此

大承氣湯以下燥屎遂結熱 陽明病下血譫語者此

欽定四庫全書

傷寒論注釋



可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之則

愈宜大承氣湯

胃中有燥屎則譫語以汗出為表未罷故云風也燥屎在胃則當下以表未和

則未可下須過太陽經無表證乃可下之若下之則燥屎雖除則表邪乘虛復陷於裏為表虛裏實胃虛熱甚語言必亂與大承氣湯

如下胃中邪熱則止傷寒四五日脉沈而喘滿沈為

在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實久則

譫語邪氣入內之時得脉沈而喘滿裏證具也則當下之反發其汗令津液越出胃中乾燥大便必難久

則屎燥胃實必發譫語

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆

欽定四庫全書

傷寒論注釋

冷若自汗出者白虎湯主之

腹滿身重難以反側口不仁譫語者陽明也針經曰

少陽病其測而微摩此而濡者少陽也遺尿者太陽也三者以陽明證多故出陽明篇中三陽合病為表裏有

邪若發汗攻表則燥熱益甚必愈譫語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗出手足逆冷其自汗出者三陽

經熱甚也內經曰熱則腠理開榮衛通汗大泄與白虎湯以解內外之熱

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難而譫語者下之則

愈宜大承氣湯

本太陽病併於陽明名曰併病太陽證罷是無表證但發潮熱是熱併陽明一

身汗出為熱越今手足絳絳汗出是熱聚於胃也必大便難而譫語經曰手足絳然而汗出者必大便已鞭也

與大承氣湯以下胃中實熱

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘



<p>澤瀉 各一兩</p>	<p>猪苓 甘平</p> <p>茯苓 甘平</p> <p>阿膠 甘平</p> <p>滑石 碎甘</p>	<p>猪苓湯方</p>	<p>也</p>	<p>上焦熱也渴欲飲水者中焦熱也小便不利者邪客下焦津液不得下通也與猪苓湯利小便以瀉下焦之熱</p>	<p>猪苓湯主之</p>	<p>人參湯主之</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>傷寒論注釋</p>	<p>湯以吐胸中之邪</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>客邪之氣乘虛陷於上焦煩動於胸中使心中懊憹而不了也舌上胎黃者熱氣客於胃中舌上胎白知熱氣</p>	<p>發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反譫語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動隔心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之</p>
-------------------	---	-------------	----------	---	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------	---	---	---	---	---	---	--



<p>甘其而反淡淡味滲泄為陽猪苓茯苓之甘以行小便 便鹹味湧泄為陰淫瀉之鹹以泄伏水滑利竅阿膠 滑石之滑 以利水道</p>	<p>右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠 烱消溫服七合日三服</p>	<p>陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥 猪苓湯復利其小便故也 <small>針經曰水穀入於口輸於腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺天熱衣厚則為汗是汗溺一液也汗多為津液外泄胃中乾燥故不可與猪苓湯利小便也</small> 脉浮而遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之 <small>浮為表熱遲為裏寒下利</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>清穀者裏寒甚也與 四逆湯溫裏散寒 若胃中虛冷不能食者飲水則噦</p>	<p>噦者噦逆是也千金曰噦逆者噦逆之名 胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦脉浮發熱口</p>	<p>乾鼻燥能食者則衄 <small>脉浮發熱口乾鼻燥者熱在經也衄能食者裏和也熱甚於經迫血為衄</small></p>	<p>衄胃中虛冷陰勝也水入於經其血乃成飲水者助陰 氣逆為噦發熱口乾陽勝也食入於陰長氣於陽能食</p>	<p>者助陽血妄為衄三 者偏陰偏陽之疾也 陽明病下之其外有熱手足溫不</p>	<p>結胸心中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之</p>	<p>表未罷而下者應邪熱內陷也熱內陷者則外熱而無 手足寒今外有熱而手足溫者熱雖內陷然而不深故 不作結胸也心中懊憹飢不能食者熱客胃中為虛煩 也熱自胸中熏蒸於上故但頭汗出而身無汗與梔子</p>
---	---	---	-------------------------	---	---	---	--	--	------------------------------	--



鼓湯以吐胸中之虛煩陽明病發潮熱大便溏小便自可胃脇滿

不去者小柴胡湯主之陽明病潮熱為胃實大便鞭而小便數今大便溏小便自可則

胃熱未實而水穀不別也大便溏者應氣降而胃腸滿去今反不去者邪氣猶在也此裏之實與小柴胡湯

以去表邪之邪陽明病脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者可

與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濇然而汗

出解也陽明病腹滿不大便舌上胎黃者為邪熱入府可下若脇下鞭滿雖不大便而嘔舌上白胎者

為邪未入府在表裏之間與小柴胡湯以和解之上焦得通則嘔止津液得下則胃氣因和汗出而解陽

明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之

欽定四庫全書傷寒論注釋

氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有

潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉

續浮者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與麻黃湯若不

尿腹滿加噦者不治浮大為陽風在表也弦則為陰風在裏也短氣腹滿脇下及心痛風

熱發於腹中而不通也若寒客於內而痛者按之則寒氣散而痛止此以風熱內壅故雖久按而氣亦不通陽

明病鼻乾不得汗自汗出者邪在表也此鼻乾不得汗而嘔者風熱內攻不干表也一身面目悉黃小便難

有潮熱時時噦者風熱攻於胃也陽明之脉出大迎循頰車上耳前過客行人熱勝則墮此風熱在經故耳前

後腫刺之經氣通腫則小差如此者外證罷則可攻若外證不解難過十日脉續浮者邪氣猶在半表半裏與



小柴胡湯以和解之若其脉但浮而不弦大無諸裏證者足邪但在表也可與麻黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦者關格之疾也故云不治難

經曰關格者不得盡其命而死 陽明病自汗出若發

汗小便自利者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自

欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆

可為導 津液內竭腸胃乾燥大便因難此非結熱故不可攻宜以藥外治而導引之

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之

勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二

寸許當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲

欽定四庫全書 傷寒論注釋

大便時乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃

當大便出

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂

枝湯

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也

陽明病脉浮

無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

陽明傷寒表實脉浮無汗而喘也與麻黃



湯以發汗陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘵熱在裏身必發黃茵陳蒿湯主之但頭汗出身無汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水漿者熱甚於胃津液內竭也胃為土而色黃胃為熱熱則色奪於外必發黃也與茵陳湯逐熱黃退

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

六兩苦微寒

梔子

十四枚擘苦寒

大黃

二兩去皮苦寒

心熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必以苦宜補必以酸大黃之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

苦寒以下瘵熱

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘵血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘵血所以喜忘也津液少大便鞭以畜血在內屎雖鞭大便反易其色黑也與抵當湯以下瘵血陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥



屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎

者宜大承氣湯

下後心中懊憹而煩者虛煩也常與梔子豉湯若胃中有燥屎者非虛煩也可

與大承氣湯下之其腹微滿初鞭後澹是無燥屎此熱不在胃而在上也故不可攻病人不大便

五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥屎故使不大

便也

不大便六七日者則大便秘結為燥屎也胃中澀其氣不得下通故繞臍痛煩躁發作有時也病

人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也

脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發

汗宜桂枝湯

雖得陽明證未可便為裏實審看脈候以別內外其脈實者熱已入府為實可與大

欽定四庫全書

傷寒論注釋

承氣湯下之其脈浮虛者是熱未入府猶在表也可與桂枝湯發汗則愈大下後六七日不

大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿

食故也宜大承氣湯

大下之後則胃弱不能消穀至六七日不大便則宿食已結不消故

便煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也與大承氣湯以下除之病人小便不利大便乍難

乍易時有微熱喘冒不能卧者有燥屎也宜大承氣湯

小便利則大便難此以有燥屎故小便不利而大便乍難乍易胃熱者發熱喘冒無時及嗜卧也此燥屎在胃

故時有微熱喘冒不得卧也與大承氣湯以下燥屎食穀欲嘔者屬陽明也吳茱

萸湯主之得湯反劇者屬上焦也

上焦主內胃為之病食穀欲嘔者胃不受



也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇
者上焦不內也以治上焦法治之

吳茱萸湯方

吳茱萸 一升洗
人參 三兩
生薑 六兩切

大棗 十二枚

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸
黃生薑之辛以溫胃人參大棗之甘以緩脾

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但

心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而

欽定四庫全書

傷寒論注釋

渴者此轉屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日

無所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五

苓散

太陽病脈浮陰弱為邪在表今寸緩關浮尺弱
邪氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳

經之邪入氣竅不和者必嘔此不嘔但心下痞者醫下

之早邪氣留於心下也如其不下者必漸不惡寒而渴

太陽之邪轉屬陽明也若吐若下若發汗後小便數大

便鞭者當與小承氣湯和之此不因吐下發汗後小便數

大便鞭若是無滿實雖不更衣十日無所苦也候津液
還入胃中小便數少大便必自出也渴欲飲水者少少
與之以潤胃氣但審邪氣所在以
法救之如渴不止與五苓散是也
脈陽微而汗出少者
為自和也汗出多者為太過
者為適當故自和汗出多



<p>者反損正氣是 汗出太過也 陽脉實因發其汗出多者亦為太過太</p>	<p>過為陽絕於裏亡津液大便因鞭也 <small>陽脉實者表熱其 也因發汗然乘虛</small></p>	<p>蒸津液外泄致汗出太過汗出多者亡 其陽陽絕於裏腸胃乾燥大便因鞭也 脉浮而芤浮為</p>	<p>陽芤為陰浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕 <small>浮芤相搏陰 陽不諧胃氣</small></p>	<p>獨治勞而生熱消 燥津液共陽為絕 跌陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則小</p>	<p>便數浮澀相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之 <small>跌陽 者脾</small></p>	<p>胃之脉診浮為陽知胃氣強澀為陰知脾為約約者檢 約之約又約束之約內經曰飲入於胃遊溢精氣上輸</p>	<p>於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸於膀胱水精 四布五經並行是脾主為胃行其津液者也今胃強脾</p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>弱約束津液不得四布但輸膀胱致 小便數大便難與脾約丸通腸潤燥</p>	<p>麻仁丸方</p>	<p>麻子仁 二升 廿平 芍藥 半斤 枳實 五斤炙</p>	<p>大黃 一斤去 皮苦寒 厚朴 一尺炙去 皮苦溫 杏仁 一升去皮尖熬</p>	<p>內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩脾 而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以飲津液腸</p>	<p>燥胃強以苦泄之枳實厚朴大 黃之苦下燥結而泄胃強也</p>	<p>右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日三服漸</p>	<p>加以知為度</p>
---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	-------------	---------------------------------------	---	--	-------------------------------------	-----------------------------	--------------



太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣

湯主之蒸蒸者如熱熏言其熱也太陽病三日發汗不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱為甚與調胃

承氣湯下胃熱傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯內經曰諸

屬於熱熱在上焦則吐吐後不解復腹脹滿太陽病若

吐若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯

和之愈吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪

其脾為約也心得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁

心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便

少者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹

須小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯針經曰脉微

為陰脉當責邪在裏得病二三日脉弱是日數雖澹而

邪氣已入裏也無太陽證為表證已罷無柴胡證為無

半表半裏之證煩躁心下鞭者邪氣內甚也胃實熱甚

則不能食胃虛熱甚至四五日雖能食亦當與小承氣

湯微和之至六日則熱甚與大承氣湯一升若不大便

六七日小便多者為津液內竭大便必鞭則可下之小

便少者則胃中水穀不別初鞭後澹雖不能食為胃

實以小便利少則未定成鞭亦不可攻須小便利屎定鞭

乃可之傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便



難身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯

內經曰諸

於目傷寒六七日邪氣入裏之時目中不了了睛不和

者邪熱內其上熾於目也無表裏證大便難者裏實也

身大熱者表熱也身微熱者裏熱也針經曰熱病目不

明熱不已者死此目中不了了睛不和則證近危惡也

須急與大承氣湯下之陽明病發熱汗多者急下之宜大承氣湯

邪熱入府外發熱汗多者熱迫津液發汗不解腹滿痛

者急下之宜大承氣湯

發汗不解邪熱傳入府而成腹滿痛者傳之迅也是須急下之

腹滿不減減不足言當下之宜大承氣湯

腹滿不減邪氣實也經曰大滿大實自可下之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下金匱要畧曰腹滿時減復如故

欽定四庫全書

此為寒當與溫藥傷寒論注釋

是減不足言也陽明少陽合病必下利其脈不負者

順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯

陽明土少陽木二經合病氣不和則必下利少陽脈不勝陽明不負是不相尅為順也若少陽脈勝陽明脈負者是鬼賊相尅為正氣失也脈經曰脈滑者為病食也又曰滑數則胃氣實下利者脈當微厥今脈滑數知胃有宿食與大承氣湯以下除之病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯



<p>數為熱客於血下之邪熱去而浮數之脈俱當解若下後數脈去而脈但浮則是榮血問熱併於衛氣問也當為邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀漸熱發渴之證此下之後浮脈去而發不解則是衛氣問熱合於榮血問也熱氣合併迫血下行胃虛協熱消穀喜飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行畜積於下為瘕血與若脈數不解而下不止必協熱而抵當湯以下去之</p> <p>便膿血也 <small>下後脈數不解而不大便者是熱不得泄畜血於下為瘕血也若下後脈數不解而下利不止者為熱得下泄</small></p> <p>傷寒發汗已身目為黃所以然者 <small>以寒濕在裏不解故也以為不可下也於寒濕中求之</small></p> <p><small>金匱要略曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃發汗已身目為黃者風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣</small></p> <p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p> <p><small>內著脾色外奪者身目為黃若瘵血在裏發黃者則傷可下此以寒濕在裏故不可下當從寒濕法治之</small></p> <p>寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之 <small>當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於外利小腹痛滿者熱氣其於外而津液不得傷寒身黃發熱下行也與茵陳湯利小便退黃逐熱</small></p> <p>者梔子蘗皮湯主之 <small>傷寒身黃胃有瘕熱當須下去之此以發熱為熱未實與梔子蘗皮散之</small></p> <p>湯解之</p>	<p>梔子蘗皮湯方</p>	<p>肥梔子 一十五箇 甘草 一兩炙 黃蘗 二兩</p>
--	----------------------	---



<p>右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服</p>	<p>傷寒瘧熱在裏身必發黃麻黃連軹赤小豆湯主之<small>濕熱</small> <small>相交民多病瘧瘧黃也傷寒為寒濕在表發黃為瘧熱在裏與麻黃連軹赤小豆湯冷熱散濕</small></p>	<p>麻黃連軹赤小豆湯方</p>	<p>麻黃<small>二兩甘</small> 赤小豆<small>一升</small> 連軹<small>二兩連軹根也苦寒</small></p>	<p>杏仁<small>四十箇甘</small> 大棗<small>十二枚擘</small> 生梓白皮<small>一斤</small></p>	<p>生薑<small>二兩辛</small> 甘草<small>二兩炙</small></p>	<p>內經曰濕上甚而熱治以苦溫佐以甘平以汗為故止此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄則不助</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>氣濕</p>	<p>右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥</p>	<p>煮取三升分溫三服半日服盡</p>	<p>辨少陽病脉證并治法第九</p>	<p>少陽之為病口苦咽乾目眩也<small>足少陽膽經也內經曰有病口苦者名曰膽瘧</small></p>	<p>甲乙經曰膽者中精之府五臟取決於膽咽乾目眩少陽之脉起於目銳眥少陽受邪故口苦咽乾目眩</p>	<p>少陽中風兩耳無所聞目赤脅中滿而煩者不可吐下</p>	<p>吐下則悸而驚<small>少陽之脉起於目背走於耳中其支者下胸中貫膈風傷氣風則為熱少陽中</small></p>
---------------------------	---	------------------	--	--	--	---	-------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------	--------------------	--	---	------------------------------	--



風氣壅而熱故耳聾目赤胃滿而煩邪在少陽為半表
半裏以吐瀉煩吐則傷氣氣虛者悸以下瀉滿下則亡
血血虛者驚傷寒脉弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發

汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

經曰

三部俱發者少陽受病脉細者邪漸傳裏雖頭痛發熱
為表未解以邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗
發汗亡津液胃中乾燥少陽之邪因傳入胃必發譫語
常與調胃承氣湯下之胃和則愈不下則胃為少陽木
邪干之故
煩而悸本太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔

不能食往來寒熱尚未吐下脉沈緊者與小柴胡湯

太陽

轉入少陽是表邪入於裏脇下鞭滿不能食往來寒熱
者邪在半表半裏之間若已經吐下脉沈緊者邪氣入

欽定四庫全書

傷寒論注釋

府為裏實尚未經吐下而脉沈緊為傳裏證深
未全入府外猶未解也與小柴胡湯以和解之若已吐

下發汗溫鍼譫語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以

法治之少陽之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損

證不罷者則不為逆柴胡證罷者壞
病也詳其因何治之逆以法救之三陽合病脉浮大

上關上但欲眠睡目合則汗

關脉以候少陽之氣太陽

大上關上知三陽合病證熱則睡少陰病但欲眠睡目

合則無汗以陰不舒有汗但欲眠睡目合則汗知三陽

有熱也傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入

陰故也

表為陽裏為陰邪在表則外有煩躁者表邪傳裏也



<p>故曰陽 去入陰傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也<small>傷寒四日表邪傳裏裏不能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也</small>傷寒三日少陽脉小者欲已也<small>內經曰大則邪至小則平傷寒三日邪傳少陽脉小者欲已也</small>少陽病欲解時當發緊今脉小者邪氣微而欲已也</p>	<p>從寅至辰上<small>內經曰陽中之少陽通於春氣寅卯辰少陽木王之時</small></p>	釋音	<p>廁<small>初吏切</small>癰<small>音假腹中久病</small>疸<small>音旦黃病</small>憤<small>古對切</small>怵<small>粉律切</small>惕<small>音</small></p>	<p>敬也又癰<small>丁賀切</small>憂懼也癰<small>勞病也</small></p>	欽定四庫全書	傷寒論注釋
傷寒論注釋卷五						



欽定四庫全書

子部
傷寒論注釋卷六
十

許慎官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣汪志伊



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷六

金成無已注

辨太陰病脉證并治法第十

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若

下之必胃下結

太陰為病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣乘而為腹滿上不得降者

嘔吐而食不下下不得上者自利蓋其時腹自痛陰寒在內而為腹滿者則為常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作痞

太陰中

欽定四庫全書

傷寒論注釋

風四肢煩疼陽微陰澀而長者為欲愈

太陰脾也主營四末太陰中風

四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澀而長者陽也陰病見陽脉則生以陰得陽則解故云欲愈

太陰病欲解時從亥至丑上

脾為陰土王於丑亥子向王故為解時

陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

經曰浮為在表沉為在裏太陰病脉浮者邪在

經也故當汗散之

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫

之宜服四逆輩

自利而渴者屬少陰為寒在下焦自利不渴者屬太陰為寒在中焦與四逆等

湯以溫其藏

傷寒脉浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當

發身黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下



利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

太陰病至七八

日大便鞭者為太陰人府傳於陽明也今至七八日暴

煩下利十餘行者脾家實腐穢去之也下利煩躁者死此

以脾氣和遂邪下泄故雖暴煩

下利日十餘行而利必自止

本太陽病醫反下之因

爾腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

表邪未罷

之邪因表虛傳於太陰裏氣不和故腹滿

時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

大實痛者桂

枝加大黃湯主之

大實大滿自可除下之

太陰為病脉

弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人

胃氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脉弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大

欽定四庫全書

傷寒論注釋

黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動利也

辨少陰病脉證并治法第十一

少陰之為病脉微細但欲寐也

少陰為病脉微細為邪氣傳裏深也衛氣行於

陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則

氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不吐心

煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自

救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛

有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰

此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴為寒在下焦屬少



陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便
色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴
然以小便色白明
非裏熱不可不察病人脉陰陽俱緊反汗出者亡陽也
此屬少陰法當咽痛而復吐利
脉陰陽俱緊為少陰傷
陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰
邪客少陰之絡令人噤痛不可內食少陰寒甚足常咽
痛而復
吐利
少陰病欬而下利譫語者被火氣劫故也小便

必難以強責少陰汗也

以火劫強責少陰汗者津液也反

竭如火氣煩之故

少陰病脉細沉數病為在裏不可發

汗

少陰病始得之反發熱脉沉者為邪在經可與麻黃
附子細辛湯發汗此少陰病脉細沉數為病在裏故

欽定四庫全書

傷寒論注釋

不可發汗少陰病脉微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱

濇者復不可下之

脉微為亡陽表虛不可發汗脉
弱濇為亡陽裏虛復不可下
少陰

病脉緊至七八日自下利脉暴微手足反溫脉緊反去

者為欲解也雖煩下利必自愈

少陰病脉緊者寒其也
至七八日傳經盡欲解

之時自下利脉暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛
而泄者則手足厥而脉緊不去今手足反溫脉緊反去

知陽氣復寒氣去故為欲解下利煩躁
者逆此正勝邪微雖煩下利必自止

少陰病下利若

利自止惡寒而踰卧手足溫者可治

少陰病下利惡寒
踰卧寒極而陰勝

也利自止手足溫者衰
和陽氣得復故為可治
少陰病惡寒而踰時自煩欲去



衣被者可治

惡寒而踴陰寒其也時時自煩欲去衣被為陽氣得復故云可治

少陰中

風脉陽微陰浮者為欲愈

少陰中風陽脉當浮而陽脉微者表邪緩也陰脉當沉而

陰脉浮者裏氣和也陽中有陰

陰中有陽陰陽調和故為欲愈少陰病欲解時從子至

寅上

三陽生於子子為一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此者陰得陽則解也

少陰病吐利

手足不逆冷反發熱者不死脉不至者灸少陰七壯

經曰

少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脉不至者吐利暴虛也灸少陰

七壯以

通其脉少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱

必便血也

膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰病至八

欽定四庫全書

傷寒論注釋

熱在太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣為熱所乘則血散下行必便血也

少陰病但厥

無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或

從目出是名下厥上竭為難治

但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱

乘經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸厥者皆屬於下但厥為下厥血亡於上為上竭傷氣損血

邪甚正虛

故為難治少陰病惡寒身踴而利手足逆冷者不治

針經曰多熱者易已多寒者難已此

少陰病吐利躁煩四逆

者死

吐利者寒甚於裏四逆者寒甚於表躁煩則陽氣欲絕是知死矣

少陰病下利止

而頭眩時時自冒者死

下利止則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

少陰病四



<p>逆惡寒而身踴脉不至不煩而躁者死<small>四逆惡寒而身踴則寒甚脉不至則真氣絕煩熱也躁亂也若煩躁之躁從煩至躁為熱來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭之變猶燈將滅而暴明</small>少陰病六七日息高者死<small>腎為生氣之源其能久乎呼吸之門少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也</small>少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得卧寐者死<small>陰氣至五六日傳經盡湯氣得復則愈反更自利煩躁不得卧寐則正氣弱陽不能後病勝藏故死</small>少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之<small>少陰病惡寒反發熱者邪在表也雖脉沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>麻黃附子細辛湯方</p>	<p>麻黃<small>二兩去節甘熱</small>細辛<small>二兩辛熱</small>附子<small>一枚炮去皮破八片辛熱</small> <small>內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經</small></p>	<p>右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗也<small>二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附子甘草湯</small></p>
--	-------------------------	-----------------	--	--	---



<p>微汗以散之</p>	<p>麻黃附子甘草湯方</p>	<p>麻黃 二兩 去節 甘草 二兩 附子 一枚 去皮 炮</p>	<p>麻黃甘草之甘以散表 寒附子之辛以溫經氣</p>	<p>右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥</p>	<p>煮取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯</p>	<p>主之 脉經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二 三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩不得</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>卧也與黃連阿膠湯扶陰散熱</p>	<p>黃連阿膠湯方</p>	<p>黃連 四兩 苦寒 黃芩 一兩 苦寒 芍藥 二兩 酸平</p>	<p>雞子黃 二枚 甘溫 阿膠 三兩 甘溫</p>	<p>陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以 甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之</p>	<p>酸收陰氣而泄邪熱</p>	<p>右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡</p>	<p>小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服</p>
--------------	-----------------	--	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	---	-------------------------	---------------------	---------------	---	-----------------------------------	---	-----------------	-----------------------------	--------------------------



少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子

湯主之
躁是無熱也
背為陽
背惡寒者
陽氣弱
陰氣勝

之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

附子湯方

附子二錢炮破八片去皮辛熱 茯苓三兩甘平 人參二兩甘溫

白朮 寸四分 溫
芍藥 三兩 平

幸以散之附子之辛以散之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然

者偏陰偏陽則為病火欲
實水當平之不欲偏勝也

定四庫全書

欽定四庫全書

傷寒論注釋

右五味以水八升煮取三升去滓温服一升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者附子湯主之。

痿骨痛若脉浮手足熱則可發汗比手足寒脉沉故當

少陰病下利膿血者桃花湯主之

不約而寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

桃花湯方

赤石脂 一斤 半 篩 末 甘 溫 乾 薑 辛 熱 粳 米 甘 平

溫可去脂赤石脂滿以溫脂胃辛以崇之
乾薑之辛以散寒寒裡米之甘以補正氣



右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合納赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病二日至四五日腹痛小便不利下利不止便

膿血者桃花湯主之二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便不利者水

弱下焦不固也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯國腸止利少陰病下利便

膿血者可刺下焦血氣留聚腐化則為膿血則之以利下焦宣通血氣少陰病吐利

手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之吐利手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者陽氣內爭與

吳茱萸湯助陽散寒少陰病下利咽痛膈滿心煩者

欽定四庫全書傷寒論注釋

豬膚湯主之少陰之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨其支別者從肺出絡心注胃中邪自陽經

傳於少陰陰虛客熱下利咽痛膈滿心煩也與豬膚湯調陰散熱

豬膚湯方

豬膚一斤味甘寒

豬水畜也其氣先入腎少陰客熱是以豬膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉

五合熬香和令相得溫分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯



陽邪傳於少陰邪熱為咽痛服甘草湯若不差與桔梗湯以和少陰之氣

甘草湯方

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二服

桔梗湯方

桔梗 一兩味辛微溫

甘草 二兩味甘平

欽定四庫全書

傷寒論注釋

桔梗辛溫以散寒甘草甘平以除熱甘梗相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能言語聲不出者與苦酒湯以解絡熱愈咽瘡

苦酒湯方

半夏 洗破如棗核大十四枚辛溫 雞子 一枚去黃內上苦酒

辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽病酸以收之苦酒之酸以斂咽瘡

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐮中安火



<p>上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑</p> <p>少陰病咽中痛半夏散及湯主之</p> <p><small>甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主少陰</small></p> <p><small>寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客熱咽痛也</small></p>	<p>半夏散及湯方</p> <p>半夏<small>洗辛</small> 桂枝<small>去皮辛熱</small> 甘草<small>炙甘平以</small></p> <p><small>內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣</small></p>	<p>已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日</p>	<p>三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>匕更煎三沸下火令小冷少少嚥之</p> <p>少陰病下利白通湯主之</p> <p><small>少陰主水少陰客寒不能制水故自利也白通湯溫裏散</small></p>	<p>白通湯方</p>	<p>葱白<small>四莖辛溫</small> 乾薑<small>一兩辛熱</small> 附子<small>一枚生用去皮破八片辛熱</small></p> <p><small>內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒</small></p>	<p>右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服</p>	<p>少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔</p>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	-------------	--	--------------------------	------------------------------



煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者

生少陰病下利脉微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒

拒陽氣逆亂之與白通湯加猪膽汁湯以和之內經曰

逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂

也故死脉微續者湯氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

葱白四乾薑一附子一枚生去

人尿五合猪膽汁一合

內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下咽

之後冷難既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除

欽定四庫全書

傷寒論注釋

情且不達而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦寒物於

白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格拒之寒也

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和

令相得分溫再服若無膽亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉

重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或

下利或嘔者真武湯主之

少陰病二三日則邪氣猶淺

至四五日邪氣已深腎主水

腎病不能制水水飲停為水氣

腹脹痛者寒濕內甚也四

肢沉重疼痛寒濕外甚也小便

不利自下利者濕勝而

水殺不制也內經曰濕勝則濡

泄與真武湯益陽氣散寒濕



真武湯方	茯苓 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩切	白朮 二兩 附子 一枚炮去皮	脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐水寒濕所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平附子芍藥生薑之酸辛以濕經散濕	右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服	後加減法	若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩 <small>氣逆欬者五味子之酸以</small>	欽定四庫全書 傷寒論注釋	收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒 <small>若小便利者去茯苓無伏水故</small>	去茯苓 <small>若下利者去芍藥加乾薑二兩</small> <small>芍藥之酸泄氣乾薑之辛散寒</small> <small>若</small>	嘔者去附子加生薑足前成半斤 <small>氣逆則嘔附子補氣生薑散氣千金曰嘔</small>	家多服生薑此為嘔家聖藥 <small>少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆</small>	脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或	咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之 <small>下利清穀手足厥逆脈微</small>	欲絕為裏寒身熱不惡寒面色赤為外熱此陰甚於內格陽於外不相通也與通脈四逆湯散陰通陽	通脈四逆湯方
------	--------------------------	-------------------	--	----------------------	------	---	-----------------	--	---	--	---	-----------------------	---	---	--------



<p>甘草 <small>二兩</small> 附子 <small>大者一枚生用</small> 乾薑 <small>三兩強人</small></p>	<p>右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其</p>	<p>脉即出者愈</p>	<p>面色赤者加葱九莖 <small>葱味辛以通陽氣</small> 腹中痛者去葱加芍藥</p>	<p>二兩 <small>芍藥之酸通寒便腹中痛為氣不還也</small> 嘔者加生薑二兩 <small>辛以散之</small></p>	<p>也咽痛者去芍藥加桔梗一兩 <small>梗則能散之</small> 利止脉</p>	<p>不出者去桔梗加人參二兩 <small>利止脉不出者亡血也加人參以補之經曰脉微而</small></p>	<p>脉病皆與方相應者乃可服之 <small>利亡血也四逆加人參湯主之</small> 少陰病四逆其人或欬</p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主</p>	<p>之 <small>四逆者四肢不溫也傷寒邪在三陽則手足必熱傳</small></p>	<p>不溫也及至厥陰則手足厥冷是 <small>到太陰手足自溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而</small></p>	<p>又甚於逆四逆散以散傳陰之熱</p>	<p>四逆散方</p>	<p>甘草 <small>炙甘</small> 枳實 <small>破水漬炙</small> 柴胡 <small>苦</small></p>	<p>芍藥 <small>酸微</small></p>	<p>內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之以苦發之枳 實甘草之苦甘以泄氣熱芍藥之酸以收陰氣柴胡 之苦以發表熱</p>
---	-----------------------------	--------------	--	--	--	--	---	------------------------------------	------------------------------	--	--	----------------------	-------------	--	-----------------------------	---



<p>右四味各十分搗篩白飲和服方寸匕日三服</p>	<p>欬者加五味子乾薑各五分并主下利<small>肺寒氣逆則欬五味子之酸收</small></p>	<p>逆氣乾薑之辛散肺寒并主下利者肺<small>逆氣乾薑之辛散肺寒并主下利者肺</small></p>	<p>與大腸為表裏上欬下利治則頗同<small>悸者加桂枝五</small></p>	<p>分<small>悸者氣虛而不能通行心下築然悸</small>小便不利者</p>	<p>加茯苓五分<small>茯苓味甘而淡用以滲泄</small>腹中痛者加附子一枚炮令</p>	<p>圻<small>裏虛遇邪則癢</small>泄利下重者先以水五升煮薤白三</p>	<p>升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半</p>	<p>分溫再服<small>泄利下重者下焦氣滯</small>少陰病下利六七日</p>	<p>欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之<small>下利不渴者裏</small></p>	<p>不渴者屬太陰以其藏寒故也此下利嘔渴知非裏寒</p>	<p>心煩不得眠知協熱也與猪苓湯<small>泄利小便分別水穀</small></p>	<p>經曰復不止當利其小便此之謂與少陰病得之二三日口燥咽乾者急</p>	<p>下之宜大承氣湯<small>傷寒傳經五六日邪傳少陰則口燥</small></p>	<p>之二三日邪氣未深入之時便作口燥咽乾者是邪<small>熱已甚腎水乾也急與大承氣湯下之以全腎也</small>少</p>	<p>陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者急下之宜</p>	<p>大承氣湯<small>少陰腎水也青肝色也自利色青為肝邪乘</small></p>	<p>心下痛口乾燥也與少陰病六七日腹脹不大便者急</p>	<p>大承氣湯以下實邪</p>
---------------------------	---	--	--	--	--	---	------------------------------	---	---	------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	------------------------------	---	------------------------------	-----------------

欽定四庫全書

傷寒論注釋



下之宜大承氣湯

此少陰入府也六七日少陰之邪入也陽明病上膈腎水則乾急

與大承氣湯下之以救腎水

少陰病脉沉者急溫之宜

四逆湯

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒

云急溫者微難寒甚然而證已形見於外治之則有咸法此初頭脉沉未有形證不知邪氣所之將發何病是

急與四逆湯溫之

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不

能吐始得之手足寒脉弦遲者此胸中實不可下也當

吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆

湯

傷寒表邪傳裏至於少陰少陰之脉從肺出絡心注胃中邪既留於胸中而不散者飲食入口則吐心中

欽定四庫全書

傷寒論注釋

溫溫欲吐陽受氣於胃中邪既留於胃中則陽氣不得宣發於外是以始得之手足寒脉弦遲此是胸中實不

可下而當吐其膈上有寒飲亦使人心胸中溫溫而手足

寒吐則物出嘔則物不出吐與嘔別焉胸中實則吐而

物出若膈上有寒飲則但乾嘔而不吐

也此不可吐可與四逆湯以溫其膈

少陰病下利脉微澀而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之

陽澀為亡血下利嘔而汗出亡陽亡血也澀液不足裏有虛寒必數更衣反少者溫其上以助其陽也灸之以

辨厥陰病脉證并治法第十二

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食



則吐衄下之利不止

邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太陰則腹滿而嘔乾未成渴

也邪至少陰者口渴舌乾而渴未成消也至厥陰成消

渴者熱甚能消水故也飲水多而小便少者謂之消渴

木生於火肝氣通心厥陰客熱氣上撞心中疼熱傷

寒六七日厥陰受病之時為傳經盡則當入府胃虛客

熱飢不欲食衄在胃中無食則動胃食臭而出得食吐

衄此熱在厥陰經也若便下之虛其胃氣厥陰木邪相

邪必吐厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

下不止厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

脈而生浮者陽也厥陰中風脈微浮為邪氣還表向汗之時故云欲愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰木也王於卯丑寅向王故為解時厥陰病渴欲飲水者少

少與之愈

邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水者少少與之胃氣得潤則愈

諸四逆

欽定四庫全書

傷寒論注釋

厥者不可下之虛家亦然

四逆者四肢不溫也厥者手足冷也皆陽氣少而陰氣多

故不可下虛家亦然下之是為重虛

金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復利

陰氣勝則厥逆而利陽氣復則發熱利必自止見厥則陰

氣還勝而

復利也



故期之旦日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者

此為熱氣有餘必發癰膿也

始發熱邪在表也至六日邪傳厥陰陰氣勝者作厥

而利厥反九日陰寒氣多當不能食而反能食者恐為

除中除去也中胃氣也言邪氣太甚除去胃氣胃欲引

食自救故暴能食此欲勝也食以索餅試之若胃氣絕

得穀則必發熱若不發熱者胃氣尚在也恐是寒極變

熱因暴熱來而復去使之能食非除中也金匱要畧曰

病人素不能食而反暴思之必發熱後三日脉之其熱

續在者陽氣勝也期之旦日夜半愈若旦日不愈後三

日脉數而熱不罷者為熱氣有餘必發癰膿經曰數脉

不時則傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲

生惡瘡為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食今反

能食此名除中必死

傷寒脉遲六七日為寒氣已深反與黃芩湯寒藥兩寒相持腹中當

冷冷不消穀則不能食反能食者除中也傷寒先厥後

發熱下利必自止而反汗出咽中痛者其喉為痺發熱

無汗而利必自止若不止必便膿血便膿血者其喉不

痺傷寒先厥而利陰寒氣勝也寒極變熱後發熱下利必自止而反汗出咽中痛其喉為痺者熱氣上行也

發熱無汗而利必自止利不止必便膿血者熱氣下行也熱氣下而不上其喉亦不痺也傷寒一二

日至四五日而厥者必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微厥應下之而反發汗者必口傷爛



<p>赤 前厥後發熱者寒極生熱也前熱後厥者陽氣內陷也厥深熱深厥微熱微隨陽氣陷之深淺也熱之伏</p>	<p>深必須下去之反發汗者引熱上行必口傷爛赤內經曰火氣內發上為口糜傷寒病厥五日</p>	<p>熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日</p>	<p>以熱五日故知自愈<small>陰勝則厥陽勝則熱先厥五日為復厥者陰復勝若不厥為陽全勝故自愈經曰發熱四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病為愈</small>凡厥</p>	<p>者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆冷是也<small>三手之</small></p>	<p>三陽相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指陽氣內陷陽不與陰相順接故手足為之厥冷也傷</p>	<p>寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此為</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>傷寒論注釋</p>	<p>藏厥非為虵厥也虵厥者其人當吐虵令病者靜而復</p>	<p>時煩此為藏寒虵上入膈故煩須臾復止得食而嘔又</p>	<p>煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者烏梅圓主之</p>	<p>又主久利方<small>藏厥者死陽氣絕也虵厥雖厥而煩吐虵已則靜不若藏厥而躁無暫安時也病人</small></p>	<p>藏寒胃虛就動上膈聞食臭出因而吐就與烏梅圓溫藏安蟲</p>	<p>烏梅圓方</p>	<p>烏梅 二百箇 味酸溫 細辛 六兩 乾薑 十兩 黃連 一斤 苦寒</p>	<p>當歸 四兩 辛溫 附子 六兩 炮 蜀椒 四兩 去 辛熱 汗辛熱</p>
---	---	------------------------------	---	--	---	------------------------------	---------------	--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	-------------	--	--



<p>桂枝 <small>六兩</small> 人參 <small>六兩</small> 黃蘗 <small>六兩</small></p> <p>肺主氣，肺欲收，急食酸以收之。烏梅之酸以收肺氣。脾欲緩，急食甘以緩之。人參之甘以緩脾氣。寒淫於內，以辛潤之。以苦堅之。當歸、桂枝、細辛之辛以潤內。寒淫所勝，平以辛熱。蒼朮、附子之辛熱以勝寒。就味甘則動，得苦則安。黃連、黃蘗之苦以安蛇。</p>	<p>右十味，異搗篩，合治之，以苦酒漬烏梅一宿，去核，蒸之，五升米下飯熟，搗成泥，和藥令相得，內白中與蜜杵二千下，圓如梧桐子大，先食飲服十圓，日三服，稍加至二十圓，禁生冷滑物臭食等。</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>傷寒熱少，厥微，指頭寒，默默不欲食，煩燥數日，小便利，色白者，此欲除也。欲得食，其病為愈。若厥而嘔，胃腸煩滿者，其後必便血。指頭寒者，是厥微熱少也。然熱不欲食，煩躁者，邪熱初傳裏也。數日之後，小便利，色白，裏熱去，欲得食，為胃氣已和其病為愈。厥陰之脈挾胃貫膈布脇肋，厥而嘔，胃腸煩滿者，傳邪之熱甚於裏也。厥陰肝主血，後數日熱不病者，手足厥冷，言我不結，胃小腹痛，按之痛者，此冷結在膀胱關元也。手足厥不結，胃者無熱也。小腹痛，傷寒發熱四日，厥反三日，復滿按之痛下焦冷結也。傷寒發熱四日，厥反三日，復熱四日，厥少熱多，其病當愈。四日至七日熱不除者，其</p>
--	---	-------------------------	--



後必便膿血

先熱後厥者陽氣邪傳裏也發熱為邪氣在表至四日後厥者傳之陰也後三日復

傳陽經則復熱厥少則邪微熱多為陽勝其病為愈至

七日傳經盡熱除則愈熱不除者為熱氣有餘內持厥

陰之血其後

必大便膿血傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為

進寒多熱少陽氣退故為進也

傷寒陰勝者先厥至四日邪傳裏重陰必陽

却熱三日七日傳經盡當愈若不愈而復厥者傳作再

經至四日則當復熱若不復熱至五日厥不除者陰勝

於陽其

病進也傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不

還者死

傷寒六七日則正氣當復邪氣當罷脉浮身熱為欲解若反脉微而厥則陰勝陽也煩躁者陽

虛而爭也灸厥陰以復其陽厥不

還則陽氣已絕不能復正而死傷寒發熱下利厥逆

欽定四庫全書

傷寒論注釋

躁不得卧者死

傷寒發熱邪在表也下利厥逆陽氣傷

寒發熱下利至甚厥不止者死

金匱要畧曰六府氣絕於外者手足寒五臟氣絕

絕於內者下利不禁傷寒發熱為邪氣獨

甚下利至其厥不止為府藏氣絕故死傷寒六七日

不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

傷寒至七日為邪正爭之時正勝則生邪勝則死始不下利而暴發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽氣脫

也故

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者不可下此

為亡血下之死

傷寒五六日邪氣當作裏實之時若不結胸而腹濡者裏無熱也脉虛者亡血

也復厥者陽氣少也不可下下之為重虛

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七

故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕

發熱而厥七



<p>日下利者為難治</p> <p><small>發熱而厥邪傳裏也至七日傳經盡則正氣勝邪當汗出而解反下利則</small></p>	<p><small>邪氣勝裏氣虛則為難治</small>傷寒脉促手足厥逆者可灸之</p> <p><small>陽虛不為</small></p>	<p><small>續厥逆則為陽虛不</small>傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎</p>	<p>湯主之</p> <p><small>滑為陽厥氣內陷是裏熱也</small>手足厥寒脉細欲絕</p>	<p>者當歸四逆湯主之</p> <p><small>手足厥寒者陽氣外虛不溫四末</small></p>	<p><small>與當歸四逆湯功陽生陰也</small></p>	<p>當歸四逆湯方</p>	<p>當歸</p> <p><small>三兩 辛溫</small></p> <p>桂枝</p> <p><small>三兩 辛熱</small></p> <p>芍藥</p> <p><small>三兩 酸寒</small></p> <p>細辛</p> <p><small>三兩 辛熱</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p><small>傷寒論注釋</small></p>	<p>大棗</p> <p><small>二十五 甘溫</small></p> <p>甘草</p> <p><small>二兩 甘平</small></p> <p>通草</p> <p><small>二兩 甘平</small></p>	<p><small>內經曰脉者血之府也諸血者皆屬心逆脉者必先</small></p>	<p><small>稍心益血苦先入於心當歸之苦以助心血心苦緩</small></p>	<p><small>急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急急</small></p>	<p><small>食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血</small></p>	<p>右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主</p>	<p>之</p> <p><small>茱萸辛溫以散久寒</small>大汗出熱不去內拘急四肢疼</p>	<p>又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之</p> <p><small>大</small>汗出則熱當去</p>	<p><small>也內拘急下利者寒其於裏四肢疼厥逆</small>大汗若大下</p>
---	---	---	--	---	-----------------------------------	---------------	---	---	--	--	--	--	---	-----------------------------	------------------------------	---	---	---



<p>知母 寒 苦 黃芩 寒 苦 姜蕤 甘 平 十八銖</p>	<p>麻黃 二兩 升麻 一兩 當歸 一兩 辛溫</p>	<p>麻黃升麻湯方</p>	<p>陰勝故生厥逆與 四逆湯因陽退陰 病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胸 中心下滿而煩飢不能食者病在胃中當須吐之宜瓜 蒂散 手足厥冷者邪氣內陷也脉緊者為實邪氣入 滿而煩胃中無邪則喜飢以病在胃中為實故心下 飢而不能食與瓜蒂散以吐胃中之邪 傷寒厥而心 下悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水 漬入胃必作利也 金匱要畧曰水停心下甚者則悸厥 與茯苓甘草湯治其水而後治其厥若 先治厥則水飲浸漬入胃必作下利 傷寒六七日大 下後寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾 膿血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之 傷寒六七日 陰之時大下之後下焦氣虛陽氣內陷寸脉遲而手足 厥逆下部脉不至厥陰之脉貫膈上注肺循喉嚨在厥 陰經射肺因亡津液遂成肺痿咽喉不利而唾膿血 也金匱要畧曰肺痿之病從何得之被快藥下利重亡 津液故得之若泄利不止者為氣虛大虛 故云難治與麻黃升麻湯以調肝肺之氣</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>利而厥冷者四逆湯主之 大汗若大下利內外雖殊其 亡津液損陽氣則一也陽虛</p>
---	---	---------------	--	-------------------------	---



<p>石膏 <small>碎納煖 甘寒</small></p> <p>白朮 <small>溫 甘</small></p> <p>乾薑 <small>熱 辛</small></p>	<p>芍藥 <small>平 酸</small></p> <p>天門冬 <small>去心 甘平</small></p> <p>桂枝 <small>熱 辛</small></p>	<p>茯苓 <small>平 甘</small></p> <p>甘草 <small>炙 甘平 各六銖</small></p>	<p>玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘以發淨熱正氣虛者以辛潤之常歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥之酸以斂逆氣萎蕤天門冬石膏甘草之甘潤肺除熱</p>	<p>右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>盡汗出愈</p>	<p>傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利也</p>	<p>傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛熱氣下趨少腹者裏虛遇寒寒氣下行欲作自利也傷寒本自</p>	<p>寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑</p>	<p>黃連黃芩人參湯主之 <small>傷寒邪自傳裏為本自寒下醫反吐下損傷正氣寒氣內為格</small></p>	<p>拒經曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則</p>	<p>重虛而死是更逆吐下與乾薑黃連黃芩人參湯以通</p>	<p>格寒</p>	<p>乾薑黃連黃芩人參湯方</p>
---	---	--	---	---	----------------------------	-------------	------------------------------	---	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	-----------	-------------------



<p>乾薑<small>辛</small> 黃連<small>苦</small> 黃芩<small>苦</small> 人參<small>甘</small></p> <p>辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格</p>	<p>右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服</p>	<p>下利有微熱而渴脉弱者今自愈</p> <p><small>下利陰寒之候反大熱者逆有微熱而渴</small></p>	<p>下利脉數有微熱汗出</p> <p><small>下利陰病也脉數陽脉也陰病得陽氣得復也今必自愈</small></p>	<p>今自愈設復緊為未解</p> <p><small>下利陰病也脉數陽脉也陰病得陽氣得復也今必自愈</small></p>	<p>下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反微喘者死</p> <p><small>下利手足厥逆無脉者陰氣獨勝陽氣大虛也</small></p>	<p>跌傷者為順也</p> <p><small>少陰腎水跌陽脾土下利為腎邪干脾水不勝土則為微邪故為順也</small></p>	<p>利寸脉反浮數尺中自濇者必清膿血</p> <p><small>下利者脉當沉而濇反浮數者裏有熱也濇為無血尺中自濇者腸胃血散也</small></p>	<p>穀不可攻表汗出必脹滿</p> <p><small>下利者脾胃虛也胃為津液之主發汗亡津液則胃氣愈虛必下利</small></p>	<p>者為欲自止雖發熱不死</p> <p><small>沉為在裏發為拘急裏氣不足是主下重大利病瘥此利未止脉微弱數者邪氣微而陽氣復為欲自止雖發熱只由陽勝非大逆也</small></p>
---	--------------------------	---	---	---	--	---	---	--	---

欽定四庫全書

傷寒論注釋



其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解	病人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也	<small>下利清穀裏有寒也面少赤身有微熱表未解也病人微厥針經曰下虛則厥表邪欲解臨汗之時以裏先虛必鬱冒然</small>	<small>後汗出</small> 下利脈數而渴者今自愈設不差必清膿血以	有熱故也	<small>經曰脈數不解而下不止必清熱便膿血也</small> 下利後脈絕手足厥	冷時時脈還手足溫者生脈不還者死	<small>下利後脈絕手足厥冷者無陽也時時周時也周時厥愈脈出為陽氣復則</small> 傷寒下利	日十餘行脈反實者死	<small>下利者裏虛也脈當微弱反實者病勝藏也故死難經曰脈不</small>	欽定四庫全書	傷寒論注釋	應病病不應下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四	逆湯主之	<small>下利清穀為裏寒身熱不解為外熱汗出陽氣逆行於外則木當厥其汗出而厥者陽氣</small>	大虛也與通脈四逆湯以固陽氣	熱利下重者白頭翁湯主之	<small>利則津液少熱則傷氣氣虛不致後重也與白頭翁湯散熱厚腸</small>	白頭翁湯方	白頭翁 <small>二兩</small> 黃連 <small>苦寒</small> 黃蘗 <small>苦寒</small> 秦皮 <small>苦寒各三兩</small>	<small>內經曰腎欲堅食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之</small>	右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更
-----------------------	-------------------	---	---------------------------------------	------	---	-----------------	---	-----------	---	--------	-------	-----------------------	------	---	---------------	-------------	--	-------	---	---	----------------------



服一升

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜

四逆湯攻表宜桂枝湯

下利腹脹滿者裏有虛寒先與四逆湯溫裏身疼痛為表未解利

止裏和與桂枝湯攻表

下利欲飲水者以有熱故也白頭翁湯主

之利飲水為有熱與白頭翁湯以涼中下利譫語者

自利不渴為藏寒與四逆湯以溫藏下利譫語者

有燥屎也宜小承氣湯

經曰實則譫語有燥屎為胃實下利為腸虛與小承氣湯以下

燥屎下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜梔子豉湯

下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者恐為發煩此煩而心下濡者是邪熱乘虛客於胃中為虛煩也與梔

欽定四庫全書

傷寒論注釋

子豉湯吐嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡自愈

胃脘有癰則嘔

而吐膿不可治嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥

者難治四逆湯主之

嘔而脈弱為邪氣傳裏嘔則氣上逆而小便當不利小便復利者裏

也為難治與四逆湯溫裏助陽乾嘔吐涎沫頭痛者吳

茱萸湯主之

乾嘔吐涎沫者裏寒也頭痛者寒氣上攻也與吳茱萸湯溫裏散寒嘔而發熱者柴胡證具傷寒大吐大下之

極虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

大吐大下胃氣極虛後極發汗又亡



傷寒論注釋卷六									
欽定四庫全書									
傷寒論注釋									
釋音									
蹇 <small>音拳不伸也</small> 憤 <small>扶粉切滿也</small> 惡濕 <small>上烏路切趾也</small> 撞 <small>宅江切學也</small>									
視其前後知何部不利之則愈 <small>下也</small> 視其前後部有									
以發其汗胃虛得水虛寒相搏成嘔也傷寒嘔而腹滿									
陽氣外泄涕唾於表則身熱醫與之水									
部小便也後部者大便也									
不利者即利之以降其氣前									



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷七

金成無已注

辨霍亂病脈證并治法第十三

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

三焦者水穀之

道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則既吐且利以飲食不節寒熱不調清濁相干

陰陽乖隔遂成霍亂輕者止曰吐利重者轉索捺亂名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼

惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐下又利止

欽定四庫全書

傷寒論注釋

復更發熱也

發熱頭痛身疼惡寒者本是傷寒因邪入裏傷於脾胃上吐下利令為霍亂利止裏

和復更發熱者還是傷寒必汗出而解

傷寒其脈微澀者本是霍亂今是

傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔下利者不

可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必

鞭十三日愈所以然者經盡故也

微為亡陽澀為亡血傷寒脈微澀則本是

霍亂吐利亡陽亡血吐利止傷寒之邪未已還是傷寒却四五日邪傳陰經之時裏虛邪必作自利本嘔者

邪其於上又利者邪其於下先霍亂裏氣太虛又傷寒之邪再傳為吐利是重虛也故為不治若欲似大便而

反失氣仍不利者利為虛不利為實欲大便而反失氣寒氣熱也此屬陽明便必鞭也十三日愈者傷寒六日



<p>傳通三陰三陽後六日再傳經盡則 陰陽之氣和大邪之氣去而愈也 下利後當使鞭鞭</p>	<p>則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經</p>	<p>能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也 <small>下利後亡津液當使鞭能</small></p>	<p>食為已和必自愈不能食者為未和到後經亡為復過 <small>一經言七日後再經也頗能食者胃氣方和過一日當</small></p>	<p>愈不愈者暴熱使之 <small>惡寒脉微而復利利止亡血也四</small></p>	<p>逆加人參湯主之 <small>惡寒脉微而利者陽虛陰勝也利止則</small></p>	<p>則無血與四逆湯滋經助 <small>陽加人參生津液益血</small> 霍亂頭痛發熱身疼痛熱多</p>	<p>欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中圓主之 <small>痛頭</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>傷寒論注釋</small></p>	<p>發熱則邪自風寒而來中焦為寒熱相半之分邪稍高 者居陽分則為熱熱多欲飲水者與五苓散以散之邪 稍下者居陰分則為寒寒多 不用水者與理中丸溫之</p>	<p>理中圓方</p>	<p>人參 甘 平 <small>內經曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之人參白朮</small></p>	<p>甘草 甘 平 <small>甘草之甘以緩脾氣調中寒濕所勝平以辛熱乾薑</small></p>	<p>白朮 甘 平 <small>之辛以溫</small></p>	<p>乾薑 辛 熱 以上 <small>胃散寒</small></p>	<p>右四味搗篩為末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合和 一丸研碎溫服之日三四夜貳服腹中未熱益至三</p>
---	------------------------------	--	--	---	--	---	--	---	--	-------------	--	--	--	--	---



四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮
取三升去滓溫服一升日三服加減法

若臍上築者腎氣動也去木加桂四兩

脾虛腎氣動者
臍上築動內經

曰甘者令人中滿木甘難
荷桂泄奔豚是相易也

吐多者去木加生薑三兩

不喜甘故去木嘔家
多服生薑以辛散之

下多者還用木悸者加茯苓二兩

津液不足則渴
木甘以緩之

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒淫所勝
以補之

寒者加乾薑足前成四兩半

寒淫所勝
以補之

寒者加乾薑足前成四兩半

欽定四庫全書

傷寒論注釋

去木加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自

溫勿發揭衣被

胃虛則氣壅腹滿甘令人中滿是
去木也附子之辛以補陽散壅 吐利

止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

吐利止裏和也身痛不休表未解也與桂
枝湯小和之外臺云裏和表病汗之則愈 吐利汗出發

熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之

上吐下利
裏虛汗出

發熱惡寒表未解也四肢拘急手足厥
冷陽虛陰勝也與四逆湯助陽退陰 既吐且利小便

復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者四逆

湯主之

吐利亡津液則小便當少小便復利而大汗出
津液不禁陽氣大虛也脉微為亡陽若無外熱



但內寒下利清穀為純陰此以外
 熱為陽未絕猶可與四逆湯救之吐已下斷汗出而厥
 四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主
 之吐已下斷津液內竭則不當汗出者不當厥今
 氣獨勝也若純與陽藥恐陰為格拒或嘔或躁不得復
 入也與通脈四逆湯加豬膽汁膽苦入心而通脈膽寒
 補肝而和陰引置湯藥不被格拒內
 經曰微者逆之甚者從之此之謂也吐利發汗脈平小
 煩者以新虛不勝穀氣故也陽新虛不勝穀氣是生小
 煩

辨陰陽易差後勞復病證并治法第十四

欽定四庫全書

傷寒論注釋

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引
 陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急
 者燒棍散主之大病新差血氣未復餘熱未盡強合陰
 而婦人與之交得病名曰陽易婦人病新差未平復男
 子與之交得病名曰陰易以陰陽相感動其餘毒相染
 弄如後易也其人病身體重少氣者振動真氣也少腹
 裏急引陰中拘攣膝脛拘急陰氣極也熱上衝胃頭重
 不欲舉眼中生花者感動之毒所易之
 氣烹蒸於上也與燒棍散以導陰氣

燒棍散方

右取婦人中棍近隱處剪燒灰以水和服方寸匕日



三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子裊襠
燒灰

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加大

黃如博碁子大五六枚

病有勞復有食復傷寒新差血氣未平餘熱未盡早作勞動病

者名曰勞復病熱少愈而強食之熱有所藏因其穀氣留傳兩陽相合而病者名曰食復勞復則熱氣浮越與

枳實梔子鼓湯以解之食復則則胃有宿積加大黃以下之

枳實梔子鼓湯方

枳實

三枚炙苦寒

梔子

十四枚擘苦寒

鼓

一升綿裹苦寒

欽定四庫全書

傷寒論注釋

枳實梔子鼓湯則應吐利此云覆令微似汗出者以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之內經

曰火淫所勝以苦發之此之謂也

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮

取二升下鼓更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似

汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脉浮者以汗解

之脉沉實者以下解之

差後餘熱未盡更發熱者與小柴胡湯以和解之脉浮者熱在

表也故以汗解脉沉者熱在裏也故以下解之

大病差後從腰已下有水氣者



<p>牡蠣澤瀉散主之 <small>大病差後脾氣虛不能制約腎水 曰腰以下腫當利小便而散水也</small></p>	<p>牡蠣澤瀉散方</p>	<p>牡蠣<small>鹹平</small> 澤瀉<small>鹹寒</small> 括萎根<small>苦寒</small> 蜀漆<small>辛平洗</small></p>	<p>葶藶<small>苦寒</small> 商陸根<small>鹹平</small> 海藻<small>鹹寒洗去鹹</small></p>	<p><small>鹹味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦泄之蜀漆葶藶括樓苦以導腫濕</small></p>	<p>右七味異搗下篩為散更入白中治之白飲和服方</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>寸匕小便利止後服日參</p>	<p>大病差後喜睡久不了了者胃上有寒當以圓藥溫之</p>	<p>宜理中圓 <small>汗後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜睡不了了與理中丸以溫其胃傷寒解</small></p>	<p>後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之 <small>傷寒解後而虛羸餘熱未盡熱則傷氣故少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱</small></p>	<p>竹葉石膏湯方</p>	<p>竹葉<small>二把</small> 石膏<small>一斤</small> 半夏<small>半斤洗</small></p>	<p>麥門冬<small>一升</small> 人參<small>三兩</small> 甘草<small>二兩甘</small></p>
---	---------------	--	--	---	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------------------------	---	---	---------------	---	--



粳米 半升 甘

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘以補不足辛者散也氣逆者欲其散也夏之辛以散氣逆

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯

成去米溫服一升日三服

病人脉已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃氣

尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈 陽明王於中言戌宿食在胃故日暮

微煩當小下之以損宿穀

欽定四庫全書

傷寒論注釋

辨不可發汗病脉證并治法第十五

夫以為疾病至急倉卒尋按要者雖得故重集諸可與

不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止

是三陰三陽出在諸可與不可中也 謂不可汗不可下病證藥方前三陰三陽

篇中經注已具者更不復出其餘無者於此已復復注備見 脉濡而弱弱反在關濡

反在巔微反在上濡反在下微則陽氣不足濡則無血

陽氣反微中風汗出而反躁煩濡則無血厥而且寒陽

微發汗躁不得眠 寸關為陽脉當浮盛弱反在關則裏氣不及濡反在巔則表氣不逮衛行



<p>脉外浮為在上以候衛微反在上是陽氣不足榮行脉中沉為在下以候榮微反在下是無血也陽微不能固外腠理開疎風因客之故令汗出而躁煩無血則陰虛不與陽相順接故厥而且寒陽微無津液則不能作汗若發汗則必亡陽而躁經曰汗多動氣在右不可發汗亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也</p>	<p>發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水也動氣者莫熨然氣動也難經曰肺內証臍右有動氣按之牢若痛肺氣不治正氣內虛氣動於臍之右也發汗則動肺氣肺主氣聞衄於鼻氣虛則不能衛血血溢妄行逆氣出於鼻為衄亡津液胃燥則煩渴而心苦煩肺惡寒飲冷則傷肺故飲即吐水動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉</p>	<p>暈經曰肝內證臍左有動氣按之牢若痛肝氣不治則正氣內虛氣動於臍之左也肝為陰之主發汗汗不</p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>止則亡陽外虛故頭眩筋動氣在上不可發汗發汗則湯肉暈針經曰上虛則眩動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在心端難經曰心內證臍上有動氣按之牢</p>	<p>之上也心為陽發汗亡陽則愈損心氣腎動氣在下不乘心虛欲上凌心故氣上衝正在心端</p>	<p>可發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食則反吐穀不得前難經曰腎內證臍下有動氣按之牢</p>	<p>臍之下也腎者主水發汗則無汗者水不足也心中大煩者腎虛不能制心火也骨節苦疼者腎主骨也目運</p>	<p>者腎病則目眩如無所見惡寒者腎主寒也食則反吐穀不得前者腎水乾也王冰曰病嘔而吐食久反出</p>	<p>是無咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲絕手足厥水也</p>
--	--	--	-------------------------	--	---	---	---	--	--------------------------------



冷欲得蹠卧不能自溫

咽門者胃之系胃經不和則咽內不利發汗攻陽血隨發散而

上必吐血也胃經不和而反攻表則陽虛諸脉得數動

微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩其

形相象根本異源

動數之脉為熱在表微弱之脉為熱在裏發汗亡津液則熱愈其胃中

乾燥故大便難腹中乾胃燥而煩根本雖有表裏之異逆治之後熱傳之則一是以病形相象也脉濡

而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦為陽

運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可發汗

發汗則寒慄不能自還

弦在上則風傷氣風勝者陽為之運動微在下則寒傷血血傷

欽定四庫全書

傷寒論注釋

者義為之陰寒外氣拂鬱為上實義有陰寒為下虛表熱義寒意欲得溫若反發汗亡陽陰獨故寒慄不能自

還欬者則劇數吐涎沫咽中必乾小便不利心中饑煩

晡時而發其形似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗蹠

而苦滿腹中復堅

肺寒氣逆欬者則劇吐涎沫亡津液咽中必乾小便不利胸中陽氣虛心

中飢而煩一日一夜氣大會於肺邪上相擊晡時而發形如寒瘧但寒無熱虛而寒慄發汗攻陽則陽氣愈虛

陰寒愈甚故蹠而苦滿腹中復堅

厥脉緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶

舌萎聲不得前

厥而脉緊則少陰傷寒也法當溫裏而反發汗則損少陰之氣少陰之脉入肺

中循喉嚨挾舌本腎為之本肺為之標本虛則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不得前

諸逆發汗病



微者難差劇者言亂目眩者死命將難全

不可發汗而強發之輕者

因發汗增重而難差重者脫其陰陽之氣言亂目眩而死鄭經曰脫陽者見鬼是此言亂心脫陰者目盲是此

目眩也眩非玄而見玄是近於盲也效而小便利若失小便者不可發汗

汗出則四肢厥逆冷

肺經虛冷上虛不能治下者效而小便利或失小便上虛發汗則渴

氣外亡四肢者詳陽之本陽虛則不與陰相接故四肢厥逆冷傷寒頭痛翕翕發熱形

象中風常微汗出自嘔者下之益煩心中懊憹如饑發

汗則致痙身強難以屈伸重之則發黃不得小便久則

發咳唾

傷寒當無汗惡寒今頭痛發熱微汗出自嘔則傷寒之邪傳而為熱欲行於裏若反下之邪熱

欽定四庫全書

傷寒論注釋

乘虛流於胃中為虛煩心懊憹如飢若發汗則虛表熱歸經絡熱其生風故身強直而成痙若重之則火熱相

合消燥津液故小便不利而發黃肺惡火久則火熱傷肺必發咳嗽而唾膿

辨可發汗病脈證并治法第十六

大法春夏宜發汗

春夏陽氣在外邪氣亦在外故可發汗

凡發汗欲令手

足俱周時出以漿漿然一時間許益佳不可令如水流

漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得重發汗

也

汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也陽虛為無津液故不可重發汗

凡服

湯發汗中病便止不必盡劑

汗多則亡陽

凡云可發汗無湯



傷寒論注釋卷七							<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>音釋</p>	<p>宜桂枝湯發汗</p> <p>外臺云裏和表</p>	<p>發汗治不為逆</p> <p>下利後身疼痛清便自調者急當救表</p>	<p>之此為逆若先</p> <p>猶不可下下之即死況此便難乎經曰本發汗而復下</p>	<p>亦當先解其外若行利藥是為大逆結胃踰急脉浮大</p>	<p>解何以故脉浮當以汗解</p> <p>經曰脉浮大應發汗發汗反下</p>	<p>大問病者言但使鞭爾設利者為大逆鞭為實汗出而</p>	<p>湯為宜金匱玉函曰水能淨萬物故用湯也</p> <p>夫病脉浮</p>	<p>者圓散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良驗</p> <p>聖濟</p>
---------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷八

金成無已注

辨發汗後病脉證并治法第十七

發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛

以通津液後自愈胃為水穀之海津液之主發汗多亡津液胃中燥必發譫語脉非實熱則

不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛通行津液津液生則胃潤譫語自止

此一卷第十七篇凡三十一證前有詳說

欽定四庫全書

傷寒論注釋

辨不可吐第十八

合四證已具太陽篇中

辨可吐第十九

大法春宜吐春時陽氣在上邪氣亦在上故宜吐凡用吐湯中病即止不

必盡劑也安在適當不欲過也病胃上諸實胃中鬱鬱而痛不能

食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲

寸口脉微滑此可吐之吐之利則止胃上諸實或痰實或熱鬱或寒結胸

中鬱而痛不能食欲使人按之反有涎唾者知邪在胃中經之氣下而無涎唾此按之反有涎唾者知邪在胃中經



傷寒論注釋卷八									
欽定四庫全書									
傷寒論注釋									
胃									
音釋									
胃 音管胃 渴 渠孽切 蒂 音帝瓜									
第六卷厥陰門瓜蒂散證同彼云脉乍緊此云脉乍結									
惟此有異緊為內實乍緊則實未深是邪在胃中結為									
結實乍結則結未深是邪在胸中所以證治俱同也									
胃中心下滿而煩欲食不能食者病在胃中當吐之與此									
其下者引而渴之病人手足厥冷脉乍結以客氣在									
吐而宿食在上脘者當吐之宿食在中下脘者則宜下									
曰其高者因而越之宿食在上脘則當吐內經									
選寸口脉微澀是上實也故可吐之玉函曰上盛不已									
曰下利脉遲而滑者內實也今下利日十餘行其脉反									



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷九

金成無已注

辨不可下病脉證并治法第二十

脉濡而弱，弱反在關，濡反在顛，微反在上，澀反在下，微

則陽氣不足，澀則無血，陽氣反微，中風汗出而反躁煩。

澀則無血，厥而且寒，陽微不可下，下之則心下痞鞭。

下之陽氣已虛，陰氣內甚，故心下痞鞭。動氣在右不可下，下之則津液內

欽定四庫全書

傷寒論注釋

竭咽噪鼻乾頭眩心悸也。

動氣在右，肺之動也。下之傷胃，動肺津液內竭，咽燥鼻乾。

者，肺屬金，主燥也。頭眩心悸者，肺主氣而虛也。

動氣在左不可下，下之則腹內

拘急，食不下，動氣更劇。雖有身熱，卧則欲蹠。

動氣在左，肝之動也。

下之損脾，而肝氣益勝，從行於脾，故腹內拘急，食不下。動氣更劇也。雖有身熱，以裏氣不足，故卧則欲蹠。動

氣在上不可下，下之則掌握熱煩，身上浮冷，熱汗自泄。

欲得水自灌。

動氣在上，心之動也。下之則傷胃，內動心氣，心為火，主熱，針經曰：心所生病者，掌中

熱。肝為藏中之陰，病則雖有身熱，卧則欲蹠，作表熱裏

寒也。心為藏中之陽，病則身上浮冷，熱汗自泄，欲得水

自灌，作表寒裏熱也。二動氣在下不可下，下之則腹脹

滿卒起頭眩食則下清穀心下痞也

動氣在下腎之動也下之則傷脾腎

氣則動腎寒乘脾故有腹滿頭眩下清穀心下痞之證也

咽中閉塞不可下下之則

上輕下重水漿不下卧則欲蹠身急病下利日數十行

咽中閉塞胃已不和也下之則閉塞之邪為上輕復傷胃氣為下重至水漿不下卧則欲蹠身急病下利日數十行

十行知虛寒也諸外實者不可下下之則發微熱亡脉厥者當

臍握熱

外實者表熱也汗之則愈下之為逆下後裏虛臍握熱內陷故發微熱厥深者熱亦深亡脉厥者

則陽氣深陷客於下焦故當臍握熱諸虛者不可下下之則大渴求水者

易愈惡水者劇

金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之虛家下之為重虛內竭津液故令大渴求水者

欽定四庫全書

傷寒論注釋

陽氣未竭而瀉可愈惡水者陽氣已竭則難可制

脉濡而弱弱反在關濡反在

顛弦反在上微反在下弦為陽運微為陰寒上實下虛

意欲得溫微弦為虛虛者不可下也

虛家下之是為重虛難經曰實實虛

虛損不足益有餘此者是中工所害也

微則為欬欬則吐涎下之則欬止

而利因不休利不休則胃中如蟲齧粥入則出小便不

利兩脇拘急喘息為難頸背相引臂則不仁極寒反汗

出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多入此為除

中口雖欲言舌不得前

內經曰感於寒則受病微則為欬甚則為泄為病肺感微寒為



發則脉亦微也下之氣下發雖止而因利不休不利
則奪正氣而成危忌胃中如蟲齧病人則出小便不利
兩脇拘急喘息為難者裏氣損也頸背相引臂為不仁
極寒反汗出身冷如水者表氣損也表裏損極至陰陽
俱脫眼睛不慧語言不休難經曰脫陽者見鬼脫陰者
目盲陰陽脫者應不能食而穀多入者此為陰中是胃
氣除去也口難言舌不

得前氣已衰脫不能運也脉濡而弱弱反在關濡反在
顛浮反在上數反在下浮為陽虛數為亡血浮為虛數
為熱浮為虛自汗出而惡寒數為痛振寒而慄微弱在
關胃下為急喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振
寒相搏形如癰狀醫反下之故令脉數發熱狂走見鬼

欽定四庫全書

傷寒論注釋

心下為痞小便淋瀝小腹甚鞭小便則尿血也

弱在關則陰氣

內弱滿在關則陽氣外弱浮為虛浮在上則衛不足也故云陽虛陽虛不固故腰理汗出惡寒數亦為虛數在下則榮不及故云亡血亡血則不能溫潤府藏脉數而痛振而寒深微弱在關邪氣傳裏也裏虛遇邪胃下為急喘而汗出脇下引痛振寒如瘧此裏邪未實表邪未解醫反下之裏氣益虛邪氣內陷故脉數發熱狂走見鬼心下為痞此熱陷於中焦者也若熱氣深陷則客於下焦使小便淋瀝小腹其鞭小便尿血也脉濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡

寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫為有大熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客



熱在皮膚，懷快不得眠，不知胃氣，冷緊寒在關元，技巧
無所施，汲水灌其身，客熱應時罷，慄慄而振，寒重被而
覆之，汗出而胃顛，體惕而又振小便，為微難，寒氣因水
發，清穀不容，間嘔變反，腸出顛倒，不得安手足，為微逆
身冷而內煩，逆欲從後救，安可復追還。
胃冷榮寒，陽微，微嘔，心煩，發不溫，胃反為有熱，解肌發汗，則表虛亡陽，煩燥，心下痞堅，先裏不足，發汗又虛，其表裏俱虛，竭矣。起頭眩，眩客熱在表，張快不得眠，醫不救裏，但責表熱，汲水澆洗，以却熱，客熱易罷，裏寒益增，慄而振，寒復以重，被覆之，表虛逆汗出，愈使陽氣虛也。顛頂也，頂胃顛，顛振寒，小便難者，亡陽也。寒因水發，下為清穀，上為嘔。

欽定四庫全書

傷寒論注釋

吐外有厥逆，內為躁煩，顛倒不安，雖欲拯救，不可得也。本草曰：病勢已過，命將難全。脉浮而大，浮

為氣實大，為血虛，血虛為無陰，孤陽獨下，陰部者，小便
當赤而難胞，中當虛，今反小便利而大汗出，法應衛家
當微，今反更實，津液四射，榮竭血盡，乾煩而不得眠，血
薄肉消，而成暴液，醫復以毒藥攻其胃，此為重虛，客陽
去，有期必下如污泥而死。
衛為陽榮，為陰衛，氣強實陰，血虛弱陽乘陰，虛下至陰部，陰部下焦也。陽為熱，則消津液，當小便赤而難今反小便利而大汗出者，陰氣內弱也。經曰：陰弱者，汗自出，是以衛家不微而反更實，榮竭血盡，乾煩而不眠，血薄則肉消，而成暴液者，津液四射也。發反下之，又虛其裏，是



為重虛孤陽因下而又脫去氣血皆竭胃氣內盡必下如汚泥而死也 脉數者久數不止

止則邪結正氣不能復正氣却結於藏故邪氣浮之與

皮毛相得脉數者不可下下之則必煩利不止 數為熱

氣結於經絡之間正氣不得復行於表則却結於藏邪氣獨浮於皮毛下之虛其裏邪熱乘虛而入裏虛叶然

必煩利 脉浮大應發汗醫反下之此為大逆 浮大為表故不可下

病欲吐者不可下嘔多雖有陽明證不可攻之 為邪猶在胃中

也 太陽病外證未解不可下下之為逆 表未解者雖有裏證亦不可下

當先解外為順若反下之則為逆也經曰本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆 夫病陽多

欽定四庫全書 傷寒論注釋

者熱下之則鞭 津液必便難也或謂陽多者表熱也下之則心

下鞭 無陽陰強大便鞭者下之則必清穀腹滿 無陽者亡

津液也陰強者寒多也大便鞭則為陰 傷寒發熱頭痛結下之虛胃陰寒內其必清穀腹滿

微汗出發汗則不識人重之則喘不得小便心腹滿下

之則短氣小便難頭痛背強加溫針則愈 傷寒則無汗發熱頭痛微

汗出者寒邪變熱欲停於裏也發汗則亡陽增熱故不識人若以火重之則火熱傷氣內清津液結為裏實故

喘不得小便心腹滿若反下之則內虛津液邪欲入裏外動經絡故短氣小便難頭痛背強若加溫針益陽增

熱必動其血 傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥而為初也



者脉初來大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡

寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤脉多睛不慧醫

復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多者便清穀

熱多者便膿血若重之則身發黃若熨之則咽燥若小

便利者可救之小便難者為危殆

脉陰陽俱緊則清邪中上濁邪中下太陽

少陰俱感邪也惡寒者少陰發熱者太陽脉欲厥者表邪欲傳裏也惡寒甚者則變熱翕翕汗出喉中痛以少

陰之脉循喉嚨故也熱多者太陽多也目赤脉多者睛不慧以太陽之脉起於目故也發汗攻陽則少陰之熱

因發而上行故咽中傷若復下之則太陽之邪因虛而內陷故兩目閉陰邪下行為寒多必便清穀陽邪下行

欽定四庫全書

傷寒論注釋

為熱多必便膿血涼之則火熱甚身必發黃熨之則火熱輕必為咽燥小便利者為津液未竭猶可救之小便

難者精液已竭矣傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃

不可制食水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假

令手足溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩

目閉食水者脉必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則戰慄陰

陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便完穀出若

發汗則口中傷舌上白胎煩躁脉數實不大便六七日

後必便血若發汗則小便自利也

傷寒發熱寒變熱也口中勃勃氣出熱客



上陽也頭痛目黃初不可制者熱蒸於上也千金曰無		陽即厥陰即嘔食水者必嘔則陰虛也惡水者厥則	陽虛也發熱口中勃勃氣出者咽中已熱也若下之亡	津液則咽中生瘡熱因裏虛而下若熱氣內結則手足	必厥設手足溫者熱氣不結而下行作協熱利下重便	膿血也頭痛目黃者下之熱氣內伏則目閉也食水為	陰虛下之又虛其裏陽氣內陷故脈厥聲啞咽閉塞	陰虛發汗又虛其裏陽氣內陷故脈厥聲啞咽閉塞	處下之又虛其裏陽氣內陷故脈厥聲啞咽閉塞	則上焦虛熱故口中傷渴舌上白胎而煩燥也緩曰脈	數不解合熱則消殺喜飢至六七日不大便者此有痰	血此脈數實不大便六七日熱畜血於內也七日之後	邪熱漸解迫血下行必便利也	便血發汗陰陽俱虛故小便便利也	下利脈大者虛也以其	強下之故也設脈浮革因爾腸鳴者屬當歸四逆湯主	欽定四庫全書	傷寒論注釋	之脈大為虛以未應下而下之利因不休也浮者按之	不足也革者實大而長微弦也浮為虛革為寒寒虛	相搏則腸鳴與當歸	四逆湯補虛散寒	辨可下病脈證并治法第二十一	大法秋宜下	秋時陽氣下行則	凡用下藥用湯勝圖中	病即止不必盡劑也	湯之為言瀉也滌腸胃既瀉	理導潤澤枯槁悅人皮膚通人血氣水能淨萬物故勝	丸散中病即止者如承氣湯證云若一服利則止後服	又曰若一服瀉語止更	下利三部脈皆平按之心下鞕	者急下之宜大承氣湯	下利者脈當微厥今反和者此	為內實也下利三部脈平者已
-----------------------	--	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------	-----------	-----------------------	--------	-------	-----------------------	----------------------	----------	---------	---------------	-------	---------	-----------	----------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------



為實而又按之心下硬則知邪甚也故宜大承氣湯下之

利未欲止當下之宜大承氣湯

氣實下利脈遲而滑者胃有宿食也脾胃傷食不消水穀是致下利者為內實若但以溫中厚腸之藥利未必

止可與大承氣湯下問曰人病有宿食何以別之師曰

寸口脈浮而大按之反澀尺中亦微而澀故知有宿食

當下之宜大承氣湯

也按之反澀尺中亦微而澀者胃有宿食下利不欲食者

以有宿食故也當下之與大承氣湯

欽定四庫全書

惡風傷寒惡下利差後至其年月日復發者以病不盡

故也當下之宜大承氣湯

邪有不盡者至春時元受月日內外相感邪必復動而

病也下利為腸胃疾宿積不盡故當下之

愈宜大承氣湯

以下病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣湯

要畧曰病者腹滿按之不痛為虛痛為實可下之腹中滿痛者裏氣壅實也故可下之

沉沉者內實也下解之宜大柴胡湯

<p>大柴胡湯以下內實經曰傷寒 已後更發熱脉沉實者以下解之 脉雙弦而遲者必心 下鞭脉大而緊者陽中有陰也 可以下之宜大承氣湯 金匱要畧曰脉雙弦者寒也經曰 遲者陰中伏陽也必心下鞭大則為 陽緊則為寒脉大而緊者陽中伏陰 也與大承氣湯以分陰陽</p>	<p>釋音</p>	<p>齧<small>魚結切</small> 齧也 齧<small>音貫澡</small> 悵悵<small>上丑亮切望悵也</small> 嚶<small>於耕切</small> 也 漑灌<small>上居代切下音貫注也</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>傷寒論注釋卷九</p>
--	-----------	--	--------------------------------------	----------------



欽定四庫全書

傷寒論注釋卷十

金成無已注

辨發汗吐下後脉證并治法第二十二

此第十卷第二十二篇凡四十八證前三陰三陽篇

中悉具載之

卷內音釋上卷已有

此已下諸方於隨卷本證下雖已有緣止以加減言之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

未甚明白似於覽者檢閱未便今復校勘脩列於後

桂枝加葛根湯方

葛根

四兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

桂枝

二兩

去皮

右陸味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內

諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜

粥餘如桂枝湯法

桂枝加厚朴杏子湯方

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十箇去皮尖餘依前法



<p>桂枝加附子湯方 <small>於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片餘依前法</small></p>	<p>方內去桂枝加白 <small>木四兩依前法</small></p>	<p>桂枝去芍藥湯方 <small>於桂枝湯方內去芍藥餘依前法</small></p>	<p>桂枝去芍藥加附子湯方 <small>於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片餘依前法</small></p>	<p>法前</p>	<p>桂枝麻黃各半湯方</p>	<p>桂枝 <small>一兩十六 林去皮</small> 芍藥 <small>生薑 切</small></p>	<p>甘草 <small>炙</small> 麻黃 <small>各一兩 去節</small> 大棗 <small>四枚 擘</small></p>	<p>欽定四庫全書 傷寒論注釋</p>	<p>杏仁 <small>二十四個湯浸去 皮尖及兩仁者</small></p>	<p>右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥</p>	<p>煮取一升八合去滓溫服六合</p>	<p>桂枝二麻黃一湯方</p>	<p>桂枝 <small>一兩十七 銖去皮</small> 芍藥 <small>一兩 六銖</small> 麻黃 <small>十六銖 去節</small></p>	<p>生薑 <small>一兩六 銖切</small> 杏仁 <small>十六個 去皮尖</small> 甘草 <small>一兩二 銖炙</small></p>	<p>大棗 <small>五枚 擘</small></p>	<p>右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥</p>
--	---	--	--	-----------	-----------------	---	---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	-----------------	--	--	---	-----------------------------





<p>大棗 <small>六枚</small></p> <p>生薑 <small>一枚</small></p> <p>柴胡 <small>四兩</small></p>	<p>右九味以水七升煮取三升去滓溫服</p>	<p>附子瀉心湯方</p>	<p>大黃 <small>二兩</small></p> <p>黃連</p> <p>黃芩 <small>各一兩</small></p>	<p>附子 <small>一枚炮去皮破別煮取汁</small></p>	<p>右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內</p>	<p>附子汁分溫再服</p>	<p>生薑瀉心湯方</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>生薑 <small>四兩切</small></p> <p>甘草 <small>三兩炙</small></p> <p>人參 <small>三兩</small></p>	<p>乾薑 <small>一斤</small></p> <p>黃芩 <small>三兩</small></p> <p>半夏 <small>半升洗</small></p>	<p>黃連 <small>一斤</small></p> <p>大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服</p>	<p>一升日三服</p>	<p>甘草瀉心湯方</p>	<p>甘草 <small>四兩</small></p> <p>黃芩 <small>三兩</small></p> <p>乾薑 <small>三兩</small></p>	<p>半夏 <small>半升洗</small></p> <p>大棗 <small>十二枚</small></p> <p>黃連 <small>一斤</small></p>
---	------------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	---------------	----------------------------	---	--	--	-----------------------------	--------------	---------------	---	---



<p>右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服</p>	<p>一升日三服</p>	<p>黃芩加半夏生薑湯方</p>	<p>於黃芩湯方內加半夏半升生</p>	<p>已上五方病證並在第四卷內</p>	<p>桂枝加大黃湯方</p>	<p>桂枝 三兩 去皮</p>	<p>大黃 一兩</p>	<p>芍藥 六兩</p>	<p>生薑 三兩 切</p>	<p>甘草 二兩</p>	<p>大棗 十二枚</p>	<p>右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>傷寒論注釋</p>	<p>桂枝加芍藥湯方</p>	<p>於第二卷桂枝湯方內更加芍藥</p>	<p>四逆加吳茱萸生薑湯方</p>	<p>當歸 二兩</p>	<p>芍藥 三兩</p>	<p>甘草 二兩</p>	<p>通草 二兩</p>	<p>桂枝 三兩</p>	<p>細辛 三兩</p>	<p>生薑 半斤</p>	<p>吳茱萸 二升</p>	<p>大棗 二十五枚</p>	<p>右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫分</p>	<p>伍服 一方水酒</p>	<p>已上三方病證並在第六卷內</p>
-----------------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	--------------	--------------------	--------------	---------------	-----------------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------------	-----------------------------	----------------	---------------------



<p>四逆加人參湯方</p> <p>於四逆湯方內加人參</p> <p>四逆加猪膽汁湯方</p> <p>於四逆湯方內加人猪膽汁半合</p> <p>之</p> <p>已上二方病證並在第七卷內</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>傷寒論注釋</p>	<p>傷寒論注釋卷十</p>
---	----------------------------	----------------

